

REVUE DES JOURNAUX

L'ICTERE CATARRHAL

ÉTUDE CLINIQUE ET PATHOGÉNIQUE

PAR MM.

J. JONIER

et

DELION

Chef de clinique adjoint à la Faculté
de médecine de Paris

Ancien externe
des hôpitaux de Paris.

Définition.—Les travaux récents poursuivis sur la pathologie hépato-biliaire, en même temps qu'ils permettaient une conception plus parfaite des divers ictères, tant primitifs que secondaires, ont établi entre eux de nombreuses similitudes et ont rendu moins strictes, de ce fait, les limites qui leur étaient primitivement marquées. Il serait néanmoins inopportun et téméraire de ne pas maintenir, sinon dans leur intégrité, du moins en leur traits essentiels, les types cliniques solidement fondés par nos devanciers sur l'observation courante.

Parmi ceux-ci, l'ictère catarrhal doit garder sa place en raison de ses caractères bien spéciaux d'*affection primitive* (au sens clinique du mot), *frappant ordinairement les jeunes gens ou les adultes, se manifestant, après quelques signes prodromiques d'em-*

Syphilis
Artério-sclérose, etc.
(Toduro Enzymes)
Todure sans Todisme

Todurase

de COUTURIEUX

57, Ave. d'Antin, Paris,
en capsules dosées à 50 ctg. d'iodure et 10 ctg. de Levurine.
