

repos, ce qui a pour effet de donner du ton aux fonctions vitales.

L'action de la morphine dans les convulsions puerpérales soit dès les premiers symptômes, soit pendant les attaques, est tellement prompte et efficace, qu'il faut être bien sceptique pour ne pas se rendre à l'évidence de son utilité.

L'administration des préparations opiacées par l'estomac n'a pas sa raison d'être, vu que ce dernier organe, malade lui-même, empêche l'absorption qui doit être prompte.

FORMULES ET PRESCRIPTIONS.

Lint à l'iodoforme.—On commence par préparer la solution d'iodoforme d'après la formule suivante :

P. Iodoforme.....	4 gram.
Ether.....	20 —
Huile de fenouil.....	1 —
Alcool dilué.....	40 —
Glycérine.....	40 —

Faites dissoudre l'iodoforme dans l'éther, auquel on unira l'huile de fenouil et l'alcool mélangé. Ajoutez la glycérine.

Trempez alors le lint dans cette solution avec les proportions suivantes :

Lint	10 parties
Solution d'iodoforme.....	25 —

Incorporez en triturant et en foulant dans un mortier.

Se prépare au moment des besoins, et il suffit de l'exposer quinze minutes à l'air pour que l'éther s'évapore.—(*New Remedies.*)—*Siècle médical.*

Constipation habituelle.—

P. Extrait de Belladone.....	gr. $\frac{1}{4}$
Podophilline.....	" $\frac{1}{8}$
Extrait de noix vomique.....	" $\frac{1}{4}$
Extrait de coloquinte comp..	" 1

M.—Pour une pilule.

A prendre le soir au moment du coucher.