FAUNE DES CADAVRES INHUMÉS

AVANT L'INHUMATION	(D) Calliphora, * Cyroncra
APRÈS L'INHUMATION	(D) Orphyra, * Phora
	(C) Philontes * Rhizophagus
	(T) Achorutes, Templetonia

Nous avons marqué du signe (*) les genres que nous avons rencontrés dans nos observations.

La liste suivante, qui renferme toutes les espèces mentionnées par Mégnin, nous a été fournie gracieusement par M. F. H. Chittendene, du bureau d'entomologie de Washington. Les espèces trouvées par nous et qui n'apparaissent pas dans la liste de Mégnin, sont placées entre guillemets []. Celles qui sont précédées de la lettre A appartiennent à l'Amérique du Nord ; de la lettre à l'Europe, la lettre C indique que les espèces qu'elle précède sont cosmopolites et sont communes à l'Amérique du Nord.

DIPTERA.—C *Musca domestica*, *Musca carnaria* = E *Sarcophaga carnaria*, C *Cyrtoneura stabularis*, C *Calliphora vomitoria*, C [*C. erythrocephala*], C *Lucia caesar*, E *Sarcophaga carnaria*, E *S. arvensis*, E *S. laticrus*, C *Prophila caei*, C *P. petasionis*, E *Anthomyia vicina* (espèces inconnues), E *Thyreophora cytophaga*, E *T. furcata*, E *T. anthropophaga*, C *Ophyra leucostoma*, E *O. calarema*, *Pyrellia cadaverina*, E *Lonchea nigripes*, C *Phora aterrima*.

COLEOPTERA.—C *Dermestes lardarius*, C *D. frischii*, C *D. undulatus*, C *Nevia* = *Ernatus ruficollis*, C *U. caeruleus*, = *violaceus*. C *Necrophora (fossor)*, *interruptus*, C *N. humator*, C [*Silpha littoralis*] = *Asbolus littoralis*, C *S. obscura*, A [*S. noviboracensis*]. C *Hister cadaverinus*, A *H. foveatus*, C *Saprinus rotundus*, A [*S. assimilis*], C *ottagenus pellio*, C *Anthrenus muscorum*, C *Tenebrio molitor*, C *T. obscurus*, C *Ptilinus brunneus*, C *Philonthus ebeninus*, C [*P. politus*], C *Rhizophagus parallelocollis*, C [*Omosita colon*, A *Trox unistriatus*].

LEPIDOPTERA.—E *Aglossa pingvinalis*, C *A. euprealis*, C *Tineola biselida*, C *T. pellionella*.

ACARI.—E *Uropoda nummularia*, E *Trachynotus cadaverinus*, C *Tyroglyphus spinipes*, *T. siro*, C *T. longior*, E *Glyciphagus spinipes*, E *G. cursor*, E *Serrator amphibius*, E *S. necrophagus*.

THYSANURA.—E *Achorutes armatus*, E *Templetonia nitida*.

Il est intéressant de constater par ce tableau le nombre restreint d'espèces de l'ordre diptère, coléoptère, acarien et lépidoptère que l'on rencontre en France ; en pratique, l'identification devient donc relativement facile.

Il faut avoir bien présent à l'esprit que les observations de Mégnin n'ont été prises que sur des cadavres humains. C'est un fait digne de remarque que de constater l'absence dans ce tableau de certaines espèces qui s'attaquent à la chair des animaux, des oiseaux et des reptiles. soit qu'ils n'apparaissent pas dans la liste de Mégnin, soient qu'ils ne s'attaquent au cadavre humain que longtemps après la dernière escouade mentionnée par l'éminent entomologiste. Les insectes nécrophores, par exemple, qui s'attaquent au gibier, après quelques jours