autres sont morts quelques jours, quelques heures ou quelques minutes après la délivrance.

A la 4^e et à la 5^e grossesse, il y eut de l'éclampsie pendant le travail : à la 6^e, éclampsie un mois avant l'accouchement et pendant le travail.

La malade dit qu'elle a vu un médecin, et a fait examiner ses urines depuis un mois. Elle avait beaucoup d'albumine. On lui prescrivit le régime lacté qu'elle n'a pas suivi.

Les dernières règles sont venues en juillet 1906, et la malade se dit à terme. Les mouvements du fœtus sont bien sentis par la mère.

Les membranes seraient rompues à minuit de dimanche à lundi (on est au mardi matin). Le liquide a coulé toute la journée d'hier.

Hauteur du fond de l'utérus 4 doigts au-dessus de l'ombilic. Palper : O. I. D. T. Auscultation dans le quart inférieur droit. Les battements du cœur de l'enfant sont très forts à 150. Pouls de la mère 110. Toucher : col de multipare, dur, de l'épaisseur du doigt, laisse pénétrer difficilement 2 doigts ; membranes rompues.

La malade nous dit qu'elle a été sous le chloroforme une partie de la nuit. Elle ne sait pas si c'est parce qu'elle avait des convulsions.

4.40 h. a. m. nouvelle dose de chloral aussitôt rejetée.

4.45 h. a. m. 2^e ACCÈS d'éclampsie qui avorte sous le chloroforme. Le coma se prolonge pendant dix minutes, (jusqu'à la nouvelle convulsion).

4.55 h. a. m. 3^e ACCÈS, un peu plus violent. Le chloroforme est administré dans la suite à chaque convulsion qui avorte plus ou moins.

4.58 h. a. m. 4^e ACCÈS.

5.05 " " " 5^e ACCÈS. — Le pouls est à 110. On injecte 15 GOUTTES d'extrait fluide de VERATRUM VIRIDE dans le bras gauche.

5.08 h. a. m. 6^e ACCÈS.

5.12 " " " 7^e ACCÈS.

5.15 " " " 8^e ACCÈS.

5.17 " " " le coma se dissipe — vomissements abondants, et répétés jusqu'à 5.45 h. a. m. — selles liquides — transpiration