

nuit avec une pommade à 10 p. 100 d'essence de térébenthine à base de lanoline ou encore avec :

Phénol. . . . .	1 gramme.
Soufre sublimé. . . . .	10 —
Lanoline. . . . .	50 —
Baume du Pérou. . . . .	2 —
Essence de bergamote. . . . .	XV gouttes.

( Journal Ph. et Ch. )

### Traitement de l'ulcère de jambe

On sait combien l'ulcère de jambe est généralement rebelle à tous les traitements. Voici, d'après le "Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (10 août 1907), la formule d'une pommade qu'emploie M. Danlos dans son service de l'hôpital Saint-Louis, et qui a paru lui donner des résultats supérieurs à ceux obtenus par les autres méthodes :

Onguent Canet. . . . .	)
Onguent Styrax. . . . .	) à à 75 gr.
Huile pour délayer . . . . .	)

Cette formule est celle qu'on utilise en été, parce qu'à ce moment les onguents sont déjà notablement ramollis par la température. En hiver, il est nécessaire d'employer 100 gr. d'huile pour délayer.

Rappelons que l'onguent Canet, qui entre dans les formules de M. Danlos, est à base d'oxyde de fer.

Cette pommade est généralement appliquée sur un linge fin, stérilisé, une mousseline, ou mieux sur un silke protective. On renouvelle l'application tous les jours ou parfois deux fois par jour. Sous cette influence, on voit la surface de l'ulcère se modifier assez vite et l'épidermisation se faire assez rapidement.

M. Beldan (de Riga) recommande une autre pommade (Münch med. Woch., et Bullet, génér. de thérapeut., 30 août 1907), qui, bien que composée d'ingrédients différents, lui a donné d'excellents résultats. En voici la formule :

Sucre blanc pulvérisé. . . . .	2 grammes.
Cire blanche. . . . .	5 —
Miel rosat. . . . .	8 —
Huile d'olives blanche. . . . .	) à à 15 —
Fiel de bœuf. . . . .	)