

Ferme expérimentale de Lacombe, Alberta.

manière à être à intervalles d'environ 10 à 12 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 10 juin, et l'arrachage des racines le 23 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.		Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.	
		ton.	lb.			ton.	lb.
	(Un an.)				(Un an.)		
1	Hartley's Bronze Top	26	800	7	Jumbo	19	16
2	Good Luck	22	1,408	8	Halewood's Bronze Top	17	848
3	Kangaroo	22	1,408	9	Perfection Swede	14	1,024
4	Skyrivers	22	352	10	Bangholm Selected	11	232
5	Monmoth Globe	22	352	11	Magnum Bonum	11	16
6	Hall's Westbury	20	1,184	12	Carter's Elephant	10	64

Le rendement moyen des quinze variétés de navets essayées à la ferme expérimentale de Lacombe en 1907 a été 18 tonnes 612 lb. par acre.

BETTERAVES FOURRAGÈRES.

Il a été essayé à Lacombe en 1907 dix variétés de betteraves fourragères. Elles ont été semées en rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à être à intervalles de 10 à 12 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 19 mai, et l'arrachage des racines le 21 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.		Numéro.	Variétés essayées.	Produit en 1907.	
		ton.	lb.			ton.	lb.
	(Un an.)				(Un an.)		
1	Giant Yellow Intermediate	32	1,528	6	Manmoth Red Intermediate	22	1,936
2	Giant Yellow Globe	28	1,562	7	Selected Yellow Globe	22	1,468
3	Halt Sugar White	28	1,562	8	Prize Mammoth Long Red	20	1,184
4	Yellow Intermediate	28	1,024	9	Crimson Champion	20	1,184
5	Gate Post	28	1,024	10	Perfection Mammoth Long Red	19	1,600

Le rendement moyen des dix variétés de betteraves fourragères essayées à la ferme expérimentale de Lacombe en 1907 a été 25 tonnes 799 lb. par acre.

CAROTTES.

Il a été essayé en 1907 six variétés de carottes des champs. Elles ont été semées en rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à