

Choléocystostomie, extraction des calculs par morcellement, drainage nul; guérison en quinze jours.

Madame D.... se présente à l'hôpital pour des douleurs dans le côté droit, région du foie.

Hérédité: Rien de particulier du côté des ancêtres; père, mère, frères et sœurs.

Habitudes: Elle a toujours demeuré à la campagne, mangeait peu de viande, et vivait assez régulièrement.

Ant. héréditaires. A part la rougeole à l'âge de 7 ans la malade n'a jamais eu de maladie grave, aucune fièvre, aucune maladie aiguë.

Réglée à 11 ans, ses pertes abondantes duraient cinq à six jours. Elle n'a jamais éprouvé de douleurs abdominales durant ses menstruations.

Mariée à 17 ans: elle est mère de sept enfants, le premier enfant à l'âge de 18 ans.

De ses sept enfants cinq sont vivants et bien portants; un bébé est mort jeune (croup) et une fille morte à 12 ans, de tuberculose, acquise.

Les accouchements ont toujours été faciles.

La malade a eu deux fausses-couches: la dernière il y a sept ans.

Le dernier enfant, il y a deux ans, fut à terme; il est vivant et bien portant.

Les menstrues sont régulières; dernières règles le 17 fév. 1912.

Mal. act.: La malade se plaint de douleurs dans le flanc droit depuis deux ans, et son médecin nous dit qu'on lui a proposé une opération sur le rein, il y a quelques mois.

Depuis deux ans, elle a eu une quinzaine de crises de douleurs dans le côté droit qui l'obligèrent de prendre le lit.

Depuis cinq mois environ, elle se plaint de vomissements bilieux fréquents: deux ou trois fois la semaine. Elle a souvent des maux de tête très violents accompagnés de nausées.

Examen: Par la palpation profonde bi-manuelle ou plutôt par le ballotement, l'on sent une tumeur mal délimitée avec de l'empiatement de toute la région. Cette tumeur immobile est douloureuse à la pression.

Opération: A l'ouverture de l'abdomen l'on trouve la vésicule