

elle niche dans les fourches des buissons. Elle pond de 4 à 5 œufs d'un blanc sale tachetés de roux au gros bout.

**2. La Fauvette du Canada.** *Myiodiocetes Canadensis*, Aud. *Muscicapa Can.* Linn. *Sylvia pardolina*, Bonap.—Angl. *The Canada Flycatcher*—Longueur  $3\frac{1}{2}$ ; ailes  $2\frac{3}{4}$ ; queue  $2\frac{1}{2}$  pouces. Dessus d'un bleuâtre cendré, dessous d'un jaune brillant. Un anneau autour de l'œil avec une ligne atteignant les narines jaunes, couvertures de la queue blanches; la couronne, les joues, avec une ligne sur le côté du cou et de la poitrine et une série de taches sur la partie supérieure de la poitrine noires; queue sans taches.

Cette Fauvette, qui fait une chasse active aux insectes, est particulièrement commune dans Ontario, et se montre aussi assez souvent dans Québec. Elle niche dans les sapins et les cèdres, et pond 4 œufs grisâtres teints de roux, et tachetés de brun au gros bout.

#### 7 Genre SETOPHAGA, Swainson.

Bec déprimé, plus large que haut, avec une forte échancrure à la pointe; soies longues. Queue plus large que longue, tarses et doigts plus courts que dans le genre précédent, doigt postérieur égal aux latéraux.

Ce genre se borne à l'espèce suivante :

**La Fauvette dorée.** *Setophaga ruticella*, Swains. *Muscicapa*, Linn. *Sylvania*, Nutt.—*The Red Start*.—Longueur  $5\frac{1}{4}$ ; ailes  $2\frac{1}{2}$ ; queue un peu plus courte que les ailes. Le dos, le cou, la gorge d'un beau noir; milieu de la poitrine, abdomen et couvertures caudales blanches; base des rémiges intermédiaires et des pennes caudales, excepté celles du milieu, d'un rouge orange ou doré, de même qu'une tache de chaque côté de la poitrine. Le rouge du mâle est remplacé par du jaune chez la femelle.

Cette Fauvette qui fait aussi une guerre incessante aux insectes, se rencontre particulièrement sur les bords des sables où elle niche dans des arbrisseaux touffus. Elle pond 5 œufs blancs maculés de gris.

(A continuer).