

CHAPITRE XVII

**Maladies de volailles.—Mesures préventives.—Coryza.—
Pepie.—Diphthérie.—Constipation.—Picage.—Rhu-
matisme et crampes.—Obstruction du jabot.—
Apoplexie.—Gales des pattes.—Diarrhée.—
Poux de volailles.—“Gape”, ver rouge
ou ver fourchu.—Tuberculose.—Etc.**

Si l'éleveur se conforme strictement aux lois de l'hygiène; s'il donne à ses oiseaux l'alimentation requise par leurs différents états ou leurs conditions diverses; s'il a le soin de soumettre à un examen sévère de quelques jours ses nouveaux sujets, avant de les introduire dans la basse-cour, il évitera un grand nombre de maladies.

On peut dire que là est, règle générale, tout le secret de la santé dans une basse-cour, et que la plupart des maladies auxquelles sont sujettes les volailles sont dûes à la négligence de l'éleveur.

MESURES PRÉVENTIVES.—Un poulailler, avec façade en coton que l'on ouvrira pour y laisser pénétrer librement les rayons du soleil, sera exempt d'humidité et respirera une atmosphère saine, si l'on a soin, bien entendu, de tenir proprement les plateformes des juchoirs, en les recouvrant constamment de sciure de bois, ou de toute autre matière absorbante, et en enlevant tous les matins les déjections au moyen d'une “gratte”. Ces ordures recueillies dans un panier, seront transportées hors du poulailler dans un endroit affecté à cette fin, de façon à ce que les volailles n'en puissent être aucunement incommodées.

Deux fois l'an, l'on fera la toilette et la désinfection du poulailler en y faisant brûler environ une demi livre de soufre, pour un poulailler de 50 poules, et en blanchissant l'intérieur à la chaux.

Pendant les grandes chaleurs de l'été, on badi-geonne toutes les deux semaines les nids et les juchoirs