



Moutons

LE CULTIVATEUR PEUT TRÈS BIEN ÉTABLIR UN TROUPEAU MÊME AU PRIX ACTUEL ET SE FAIRE DE 50 À 70% DE PROFIT PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE

Des soins intelligents sont nécessaires pour prévenir des pertes exagérées en quantité et en qualité sur la viande des agneaux et la laine.

Les profits annuels du troupeau dépendent surtout du soin avec lequel il a été hiverné.

Si les moutons sont infestés de tiques; lavez-les immédiatement; vous économiserez ainsi près de la nourriture d'hiver. Les moutons pouilleux consomment plus de nourriture que les autres tout en restant maigres et faibles. Ils produisent moins de laine et cette laine est moins bonne.

La laine en suint vaut 65 cents la livre. C'est plus que le beurre, le fromage, le bœuf, les œufs ou autres produits périssables; sûrement, elle vaut la peine d'être soignée. Il n'y a que les toisons propres qui rapportent le prix maximum. Quelques moments passés à réparer les rateliers, les descentes à fourrage, les loges pour empêcher la balle, la poussière ou les toiles d'araignée de tomber dans les toisons seront du temps bien employé.

Les brebis mal hivernées et qu'on laisse s'affaiblir ou tomber malades produisent des agneaux faibles et des toisons légères. Cette toison est toujours d'une petite valeur, à cause de la faiblesse des fibres produites pendant la période de lent développement. Les bons soins en hiver rapportent de toutes façons.

Ne vendez pas les agneaux du printemps non à point. Engraissez vos agneaux pour Pâques. C'est un moyen d'écouler vos fourrages qui vous rapportera \$1 à \$1.50 par agneau de plus que si vous les vendez non à point.

Ration d'engraissement en hiver. Racines (navets et de préférence s'il y a des moutons châtrés) 4 à 6 livres; ou ensilage et racines, en parties égales, 4 à 5 livres; foin (trèfle et herbes fines) 1½ à 3 livres; mélange de grain, que voici:

1. Avoine, 3 parties; son, 1 partie; maïs, 1 partie.
2. Avoine, 4 parties; son, 2 parties; tourteaux de lin, ½ partie.

Commencez avec ¼ livre par agneau par jour, et finissez avec 1 livre par jour. Les criblures des éleveurs du gouvernement, contenant un minimum de graines noires (moutarde, etc.) sont avantageuses dans la ration de grain. Les différentes qualités de criblures, telles que les "Scalpings", criblures de liseron, etc., peuvent aussi être le grain le meilleur marché pour les bovins et les porcs.

Ne tenez jamais les moutons trop renfermés en hiver. Laissez en tout temps les portes de la bergerie ouvertes sur le côté non exposé aux vents. L'excès de chaleur est la cause directe des refroidissements, de la pneumonie, de la chute des toisons et des désordres de ce genre, qui sont souvent fatals.

Le soin du troupeau à l'agnelage

Voici une bonne ration d'hiver pour les brebis pleines: bon foin, de préférence de trèfle ou de luzerne, 2 ou 3 livres, pesats de pois non battus, 2 ou 3 livres. En outre, racines, de préférence, des choux de Siam, données à raison de 2 livres par jour, ou de l'ensilage et des racines, 4 livres. Si les brebis sont maigres, donnez du grain au besoin; le sel et l'eau doivent être fournis généralement et régulièrement. A mesure que l'époque de l'agnelage approche, diminuez la ration, spécialement celle de racines et d'ensilage.

L'ALIMENTATION DES BREBIS APRÈS L'AGNELAGE.—Nourrir légèrement pendant les premières vingt-quatre heures. Une buvée chaude avec un léger repas de betteraves fourragères hachées et de grain, est très bonne. Il faut prendre trois jours pour revenir à la ration entière; ensuite on nourrira pour le lait. Donnez tout le foin et les racines, de préférence des betteraves fourragères que la brebis peut consommer, et une ration de grain, approximativement 2 livres par jour, d'un mélange d'avoine, 5 parties, son, 1 partie, tourteaux de lin, 1 partie. Même si l'agnelage se fait au pâturage, il peut être bon de donner du grain.

ALIMENTATION DES JEUNES AGNEAUX.—Lorsque les agneaux ont de huit à dix jours, ils grignotent du foin fin et du grain. Plus tard, on leur donnera une auge et un râtelier séparés où ils pourront apprendre à manger. Il n'y a pas d'aliments qui valent mieux sous ce rapport que l'avoine, le son, les tourteaux de lin, le bon trèfle de foin fin. Faites tous les changements graduellement des quartiers d'hiver au pâturage, pour les agneaux et les brebis, évitant ainsi la diarrhée, la météorisation et tous les autres troubles digestifs.

LOGEMENT POUR L'AGNELAGE.—Les brebis qui agnellent en hiver doivent avoir un hangar confortable. Le plancher doit être sec, bien muni de litière, et plat. Il est souvent préférable d'avoir des loges séparées que l'on peut faire en rassemblant, au moyen de charnières, des barrières de 4 pieds et en les ajustant dans l'angle et le long des murs du hangar. L'air pur est essentiel dans les loges. Les râteliers fournis aux brebis avant et après l'agnelage doivent être construits de façon à empêcher que les impuretés et les brindilles de foin ne tombent dans la toison, car elles en réduisent la valeur, et les jeunes agneaux cherchent ces brindilles de foin dans la toison de leur mère; ils avalent avec elles de la laine qui forment des boules dans leur estomac et ils meurent.

Enlevez toutes les mèches des flancs et des mamelles des brebis avant l'agnelage pour empêcher la formation de boules de laine chez les agneaux. Soyez présent pour aider à

l'agnelage. Il n'y a que les agneaux faibles qui ont besoin d'aide. Il faut les réchauffer et les mettre immédiatement à téter. S'ils sont très faibles, donnez un peu de stimulant dans le lait de la mère.

Conservez les agneaux orphelins, jumeaux et ceux qui ne sont pas acceptés tout de suite par leur mère. Vous augmenterez ainsi les recettes. Il suffit d'un peu de soin et de patience pour encourager une brebis à adopter un agneau.

Coupez les queues des agneaux mâles et châtrez-les aussitôt que possible.

Marquez les agneaux lorsqu'ils sont jeunes. Il est nécessaire, dans un bon troupeau, de savoir ce que produit chaque brebis.

Tondez le troupeau aux premières journées chaudes. La brebis chargée d'une lourde toison ne peut produire du lait.

N'oubliez pas de baigner régulièrement au printemps les brebis et les agneaux, peu après la tonte.

E.-S. ARCHIBALD,
Éleveur du Dominion.

L'alimentation de la truie et de ses petits

La truie pleine fait un double travail; elle se maintient en bon état de chair et construit de nouveaux os et de nouveaux tissus dans les petits qu'elle porte.

Le nombre de petits dans la portée, leur grosseur, leur poids et leur vitalité dépendent principalement de l'état de la truie au moment de la saillie et pendant la gestation. Les bons éleveurs nourrissent donc très soigneusement leurs truies.

La constipation pendant la gestation cause des troubles très sérieux chez la truie et les petits, surtout ces derniers; il en résulte beaucoup de pores petits, profitant mal, qui meurent rapidement. Une bonne alimentation, l'exercice modéré pendant la gestation, préviennent toujours cette difficulté.

L'exercice est surtout essentiel avant et après la mise-bas. A l'exception de la courte période passée dans la loge chaude de la mise-bas, la truie pleine doit être tenue dans un petit abri bon marché et avoir un parcours toute l'année. Faites-la travailler pour se nourrir; elle n'en digérera que mieux, elle sera moins souvent malade et ses petits seront plus forts et mieux portants.

L'ALIMENTATION PENDANT LA GESTATION.—Les truies portières doivent recevoir une abondance de fourrages riches et succulents. En été, un bon pâturage, de préférence de trèfle ou de luzerne, fait très bien l'affaire. A défaut de pâturage, donnez des fourrages verts généreusement. Pendant l'hiver, donnez des fourrages qui ressemblent au bon pâturage d'été. Le foin de luzerne ou de trèfle, donné sec dans des râteliers avec des racines, comme les betteraves fourragères hachées, des pommes de terre et des navets cuits, sont très bons. Une bonne ration de grain est la suivante: avoine moulue et recoupes de blé en parties égales, son, deux parties, petit son ou recoupes, une partie on augmente graduellement ces derniers et on ajoute un peu de tourteaux de lin. Évitez de donner plus d'un quart de la ration en