voulons essayer de dissiper une confusion regrettable. Quoi qu'il en soit, dans la période prétuberculeuse proprement dite, il existe de la fièvre, souvent caractérisée le soir. Cette fièvre est causée par la mauvaise nutrition générale de l'organisme.

On a décrit des phtisies larvées à début fébrile. Il s'agit de bacillose confirmée, malgré le peu de netteté des signes d'auscultation. Cette fièvre a même été confondue avec une fièvre intermittente.

La conclusion pratique est celle-ci : chez un sujet qui, sans raisons apparentes, fait le soir des poussées de fièvres, on doit penser, en l'absence d'autre diagnostic, à une menace de tuberculose et modifier le terrain organique.

* * *

DE QUELQUES SIGNES PARTICULIERS PRÉTUBERCULEUX. — Sommes-nous bien fondés à donner un court résumé de quelques signes de diagnostic précoce de la tuberculose, quand nous avons déclaré qu'il s'agissait seulement de prétuberculose. Nous croyons qu'il est certains cas où l'auscultation, la percussion ne donnant rien, la lésion est si minime qu'elle passe inaperçue. On est là sur la frontière qui sépare la lésion de la pré-lésion.

(a) *Signe de la vibration exagérée du poumon malade.* — M. Marat (de Begles), a constaté en l'absence de tout signe d'auscultation, que le malade en parlant fort, sent vibrer le poumon atteint. Même par un mouvement instinctif, quand il a des éclats de voix, il immobilise le bras du côté atteint. Ce faisant il met une véritable sourdine au poumon malade. Cette résonance est toujours très précocement perçue par le malade (1).

(b) Nous ne parlerons que pour mémoire des signes de Grancher pour la tuberculose infantile, différence de tonalité du murmure vésiculaire, leur place étant dans le diagnostic précoce.

* * *

PRÉTUBERCULOSE ANATOMIQUE. — Nous appellerons ainsi des modifications dans le squelette, dans l'ensemble physique des sujets qui deviennent ainsi facilement tuberculeux. Ce sont des

(1) Nouveau signe de diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire in *Presse Médicale*, 1899 page 123 tome I.