

MEMOIRES

ANALGÉSIE CHIRURGICALE ET OBSTÉTRICALE PAR INJECTION SOUS-ARACHNOÏDIENNE LOMBAIRE DE COCAÏNE

Par M. le Docteur A. MAROIS, de Québec.

Depuis une couple d'années l'emploi de la cocaïne en injection sous-arachnoïdienne lombaire comme substitut à l'anesthésie générale dans les opérations qui se pratiquent au-dessous du diaphragme a attiré l'attention du monde médical. Je crois intéresser les membres du congrès en leur faisant connaître les résultats obtenus à l'Hôtel-Dieu de Québec par cette méthode d'analgésie. Mes observations sont au nombre de cent, quelques unes sont dues à l'obligeance de mes collègues, les autres me sont personnelles. On attribue généralement à Bier d'avoir le premier en 1899 préconisé cette méthode, mais dès 1885 Léonard Corning neuro-pathologiste de New-York rapporta, dans le New York Medical Journal, un cas d'anesthésie complète de la moitié inférieure du corps par injection sous-arachnoïdienne de cocaïne. C'est cependant sans contredit à Tuffier, chirurgien de l'Hôpital Beaujon à Paris, que revient le mérite d'avoir rendu pratique ce nouveau mode d'analgésie. Ici en Canada, Monsieur le Dr Ahern a été le premier à employer ce nouveau procédé; c'est à l'Hôtel-Dieu de Québec que mon collègue et ami a pratiqué avec succès la première injection intra-rachidienne pour la cure chirurgicale de l'appencicite.

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

La méthode que j'ai suivie est celle indiquée par Tuffier