

BLENNORRAGIE.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

Administration générale de l'Assistance publique, à Paris

HOPITAL SAINT-LOUIS

Consultation de M. le Professeur Gaucher

I.—TRAITEMENT A SUIVRE.

1.—Pendant toute la période où l'on souffre en urinant, prendre trois fois par jour cinquante centigrammes de bicarbonate de soude dans un peu d'eau.

2.—Quand l'écoulement sera devenu blanc et que l'on ne souffrira plus en urinant, prendre trois fois par jour gros comme une noisette de l'opiat cubèbe et copahu.

3.—Pendant toute la période douloureuse de la maladie, prendre deux fois par jour un bain de verge avec une solution tiède d'eau boriquée (on prépare l'eau boriquée soi-même, en achetant de l'acide borique au kilogramme et en le faisant dissoudre dans la proportion de un demi-kilogramme pour douze litres d'eau bouillante).

Si la douleur est très vive la nuit, tenir la verge entourée de compresses humides.

4.—Porter un suspensoir.

II.—REGIME A SUIVRE. HYGIENE.

1.—S'abstenir d'aliments excitants, d'alcool, de café, de vin pur et de bière.

2.—Boire au moins, chaque jour, un litre de lait et deux litres de tisane d'orge ou de chiendent.

3.—Tous les deux jours, prendre un grand bain tiède prolongé.

III.—PRECAUTIONS A PRENDRE.

1.—S'abstenir de toute injection, à moins d'indications spéciales du médecin.