

Nous le répétons, de nouveau, ce *materna* ne vaut qu'en autant que le lait employé est essentiellement frais. C'est pourquoi — à moins d'exceptions rares — son usage est restreint en ville où le lait est presque toujours frelaté.

Dans le cas où le médecin n'aurait pas de *materna* à sa disposition, il peut arriver au même résultat en consultant le tableau suivant :

Formules	1	2	3	4	5	6
	3e au 14e jour	2e à la 6e semaine	6e à la 11e semaine	11e semaine au 5e mois	5e au 9e mois	9e au 12e mois
	Parties	Parties	Parties	Parties	Parties	Parties
Lait	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	2	4 $\frac{1}{2}$	6	9 $\frac{1}{2}$
Crème	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2	2	1
Eau de chaux..	1	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	5 $\frac{1}{4}$
Eau	12 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{4}$	11 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
Sucre de lait...	1	1	1	1	1 $\frac{1}{4}$	

La crème que l'on emploie doit être prélevée sur un lait frais qui repose depuis 5 à 6 heures au plus. Il ne faut pas prendre de la crème de 24 heures, elle est déjà trop âgée. . .

Lorsqu'il est impossible de se procurer un bon lait, suffisamment frais pour que l'enfant puisse le digérer, même lorsqu'il est préparé comme ci-dessus, on emploie, alors, les différentes préparations alimentaires bien connues, *v. g. Horlick's malted food milk, etc.* Laites et crèmes condensés en vente chez tous les pharmaciens.

Il ne faut pas oublier que ces aliments ne peuvent pas remplacer le bon lait, c'est un pis-aller qui devra rendre de grands services en maintes occasions.

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX DE LA GASTRO-ENTERITE.

Nos lecteurs remarqueront que nous avons passé sous silence, et pour cause, les lavages de l'estomac et les irrigations de l'intestin, préconisés il y a quelques années. Ce mode de traitement n'a pas donné les résultats auxquels on s'attendait, et il a été abandonné à cause des difficultés qui tiennent tant de l'enfant que de son entourage.