par l'énorme amélioration qu'on peut procurer à l'état du malade.

Enfin, il ne faudra jamais négliger la médication de l'état général à appliquer au malade, médication qui se bornera surtout à préconiser la vie au grand air, à la campagne, le repos intellectuel et physique absolu, la suralimentation, l'abstention complète de toute boisson alcoolique ou excitante, l'administration en grande quantité de tisanes de bourgeons de sapin, enfin le séjour au bord de la mer, lorsque les cas ne sont pas trop accentués.

Le traitement général a certainement une influence considérable qu'on ne doit jamais négliger.

Ligature du Cordon Ombilical

Procédé rapide pour faire une ligature solide sur les grands cordons gélatineux par le

Dr A. Brisset

Assistant à la Maternité.

Dans la plupart des cas, une simple ligature circulaire faite autour du cordon ombilical suffira amplement pour faire l'hémostase des vaisseaux restés béants après la section.

Mais il arrive souvent, que ce cordon, au lieu d'être de volume normal, est gros et épais, parceque une grande quantité de gélatine de Wharton est accumulée sous l'enveloppe ammiotique : il peut arriver alors, que par suite de la chaleur du corps, le cordon se dessèche rapidement et le fil de la ligature n'exerçant plus aucune action constrictive sur les vaisseaux ceux-ci, sous un effort quelconque de l'enfant se remettent à saigner occasionnant ainsi une hémorrhagie souvent mortelle.

C'est pour obvier à cet accident, que plusieurs accoucheurs, Budin entre autres, ont imaginé différents procédés de ligature. Un de ceux qui donnent actuellement le plus de sécurité ou point de vue d'une hémorrhagie secondaire est le procédé de Budin " ligature en bouchon de Champagne ". Mais, cette ligature est assez compliquée et j'ai été souvent témoin des difficultés qu'avaient les élèves des maternités à l'exécuter. C'est alors, que je leur ai proposé le procédé suivant, d'une exécution très rapide et qui donne les mêmes garanties de sécurité.

Préparation des fils pour la ligature.

Coupez 4 ou 6 brins de fil de lin ou de chanvre suivant leur grosseur, de 0.25 à 0.30 *centimètres* de long unissez-les ensemble par un nœud simple fait au milieu de leur longueur (Fig. A). Vous aurez ainsi une corde

Fig. A



Fig B

Ligature circulaire du cordon.



Fig. C Fig. D Fig. E

Ligature transversale et écrasement du pédicule.