

—Long. .85 pouce. Brun-roussâtre plus ou moins foncé. Face rougeâtre; antennes rougeâtres à la base, le dessus de la tête avec le dos du prothorax et la face dorsale des élytres, testacé. Vertex légèrement relevé en une ligne formant un petit bourrelet, sans ligne carénale au milieu; fovéoles peu profondes, plus larges en arrière. Une bande noire part en arrière des yeux et se prolonge sur les côtés du pronotum, la carène latérale de celui-ci la coupant obliquement à l'extrémité. Pronotum à carènes peu soulevées, les latérales parallèles dans leur moitié antérieure, mais divergentes postérieurement, le bord postérieur presque droit. Elytres plus longues que l'abdomen, brunes à la base, transparentes à l'extrémité, avec une bande médiane de taches brunes s'étendant jusque vers les deux tiers de leur longueur. Ailes hyalines avec nervures brunes. Pattes brun-jaunâtre, les cuisses postérieures noires à l'extrémité avec anneau pâle en avant, leurs jambes d'un brun de plomb avec un anneau pâle au dessous de la base, leurs épines jaunes, noires à l'extrémité.—PC.

Moins commun que les précédents. Capturé au Cap-Rouge.

Gen. CHLOËALTIS, Harr. Vol. VIII, p. 135.

Au lieu de :

Chloealtis du Canada. *Chloealtis Canadensis*, nov. sp.;

lisez :

Chloealtis sub-hyaline. *Chloealtis (Amblytropedia) subhyalina*, Scudd.

Gen. TETTIX. Latr. Vol. VIII, p. 136.

P. 137,

Effacez l'espèce 4, *T. cucullata*, que nous avons attribuée à une variété de l'*ornata*.

La fig. 6 représente le Tétrix latéral, de grandeur naturelle. L'espèce est très variable dans sa coloration.

Page 139 Vol. VIII.



Fig. 6.

Effacez le genre *Batrachidea* que nous n'avons pas encore rencontré. Les deux espèces que nous en donnons sont encore des *Tettix ornata*, non encore complètement développés, encore à l'état de larves. Il est bien probable cependant que ce genre doit aussi se rencontrer dans notre Province.