

6—*Labourer le sol du potager et du verger dès l'automne a pour effet de mettre à jour bon nombre de cocons dont les eaux de fonte ou de pluies réussiront à tuer l'occupant.*

7—*Engluer le tronc de l'arbre ou l'entourer d'une bande de substance gommeuse, graisse, "tree tanglefoot", coaltar, huile de ricin (castor) et résine mélangés, saindoux et soufre, enlève la plupart des chenilles et papillons qui s'aventurent à faire l'ascension de l'arbre; renouveler l'application si elle se dessèche ou se recouvre d'insectes. On met ordinairement cette bande à 4 ou 5 pieds du sol.*

8—*Sur les légumes, il faut enlever à bonne heure les œufs, larves, insectes qu'on y voit; faire dans ce but de fréquentes visites.*

9—*Le premier arrosage du verger empêche le développement du piquebouton, tue les kermès, les œufs et les petites chenilles.*

10—*Autour du pied des choux, on met une rondelle de papier goudronné bien à plat sur le sol, ne laissant au centre que l'espace nécessaire pour faire passer la tige. C'est un excellent préventif contre les attaques des vers à chou.*

11—*Surveiller constamment les arbres du verger, les légumes du potager, pour enlever et détruire les premiers ravageurs qui font leur apparition.*

12—*Protéger spécialement les oiseaux (sauf les moineaux) dont la plupart se nourrissent principalement d'insectes. A cette fin, faire des boîtes percées d'ouvertures et les suspendre aux arbres afin de faciliter aux oiseaux le moyen de faire leur nid et de se reproduire.*

13—*Quelques moyens efficaces de contrôler vers gris et blancs :*

a) Ne pas planter avant juin les plantes tendres (chou, tomate, etc.).

b) Arroser les choux, navets, etc., dès l'apparition des premiers vers, et renouveler souvent l'arrosage. On peut aussi saupoudrer avec de la suie ou de la cendre de bois.

c) Mélanger la graine d'oignon avec de la suie ou de la cendre de bois et semer le tout ensemble. Si on a négligé cette précaution, répandre sur le sol une mince couche de fumier de volailles.

d) Arracher et détruire les cotons de choux, après la récolte

Remèdes

1—*Secouement.* Plusieurs bestioles, certaines chenilles, tombent par terre lorsqu'on secoue fortement les parties de l'arbre où elles sont blotties. Pour obtenir plus de succès, on se sert d'un maillet rembourré et à long manche dont on frappe les branches chargées de grappes de chenilles. Si on a eu soin d'étendre au préalable une toile sur le sol, il devient facile de recueillir les insectes tombés et de les brûler; on peut encore se servir du procédé de l'engluement dont nous avons parlé tout à l'heure.

2—*Destruction des tentes et des chenilles.* Avec un échenilloir, on coupe les portions de branches recouvertes de tentes ou de chenilles pour les brûler ensuite. Il est dangereux pour la vie de l'arbre de vouloir exposer les tentes au feu d'une torche.