

à reprendre leur ancienne prépondérance. Le *thuya*, appelé généralement cèdre, était assez fréquent, et de belles dimensions; c'est un bois fort précieux pour le cultivateur à qui il fournit des piquets, des perches, des bois de construction durables, et on doit le protéger au cours des exploitations. Le *tamarac*, mieux connu sous le terme impropre d'épinette rouge,—car ce n'est pas une épinette mais un mélèze,—commence à réapparaître dans les terrains humides. C'était un arbre précieux qui a été presque annihilé à la suite des attaques de la mouche-scie du mélèze; il est à souhaiter que l'on voit à le propager par des plantations nombreuses. Parmi les bois francs, nous constatons que les érables sont assez rares, on trouve quelques bosquets d'érable rouge et d'érable à sucre. Il serait désirable d'en planter au lieu de l'érable négundo comme on l'a fait en divers villages. Le merisier (*Betula lutea*) est l'arbre à feuilles caduques le plus prisé de la région mais son aire est restreinte tandis que celle des bouleaux à papier (*Betula papyrifera*) et des bouleaux gris (*Betula populifolia*) embrasse tout le bassin. Ces bois fournissent le combustible nécessaire et conviennent aussi pour divers travaux de charronnage. Le *peuplier tremble* (*Populus tremuldes*) est bien commun. Commensal du pin gris, il envahit rapidement les parcelles ravagées par les incendies; son bois est assez bon, et convient à divers usages domestiques et aussi à la fabrication des pâtes de bois; on l'emploie à l'usine de Chicoutimi à cette dernière fin avec profit. Le *peuplier baumier* (*Populus balsamifera*) est aussi fréquent dans les endroits humides, mais son bois est moins bon que celui du tremble. Parmi les autres arbres dont la distribution est moins abondante et dont la valeur est partant restreinte, se trouvent les frênes noir et vert (*Fraxinus pennsylvanica* et *F. sambucifolia*), l'orme (*Ulmus americana*), le cormier (*Pyrus americana*) que l'on pourrait utiliser comme arbre d'ornement, les saules, etc. Comme arbrisseaux, on trouve l'aune commun (*Alnus incana*), le coudrier (*Corylus americana*), le viorne ou *pembina* (*Viburnum opulus*) divers cornouillers, comme la *hart rouge* (*Cornus stolonifera*), le sureau (*Sambucus canadensis*) la petite poire ou amélanchier (Ame-