Teinture de fleurs d'arnica	2	parties.
Acide tannique		
Poudre de gomme d'acacia	1	
à employer aussitôt après sa préparation	1	

Tremper dans ce mélange un pinceau en poils de chameau ou les barbes d'une plume et faire sur le furoncle, en dépassant un peu sur les parties voisines, des badigeonnages que l'on répètera toutes les quinze minutes, c'est-à dire aussitôt que l'enduit sera sec, de manière à recouvrir le mal d'une bonne couche, épaisse et solide.

Sous l'influence de ce moyen, la douleur pulsative et sensitive est rapidement soulagée; le gonflement des téguments diminue, le malade se sent mieux, et si le furoncle est au premier degré il avorte sans suppurer. Si la suppuration est déjà faite, le bourbillion se détache facilement et la guérison se fait rapidement. (The Doctor.)

L'AVEMENT DE CHLORATE DE POTASSE ET DE GLYCÉRINE DANS LA DYSSENTERIE CHRONIQUE.--Le docteur Théodore Meud recommande la formule suivante:

plus qu'on pourra.

Les premiers effets de ce lavement sont habitueilement une assez forte cuisson; les malades arrivent à garder l'injection de plus en plus longtemps; le nombre des selles diminue et en quelques semaines la guérison se fait. (New York med. journ. et Nuova Liguria Medica.)—Lyon M.

MINTURE PHÉNIQUÉE contre la diarrhée des enfants :

A prendre par cuillerée à casé de deux en deux heures. Ne pas donner de lait aux ensants, mais des boissons mucilagineuses en petite quantité et à intervalles réguliers.

—(Pabellon medico.).—Mouv. Medical.

Traitement de la teigne.—M. Bourdier, depuis quelque temps, paraît obtenir d'heureux résultats d'un nouveau mode de traitemen t