



les points *aa* s'abaissent diagonalement de chaque côté, l'équerre est encore descendue, la branche ascendante, en arrivant à la vulve, est formée de poils hérissés, déviant un peu en montant. L'écusson à droite est aussi plus allongé, et formé de poil hérissé; l'échancre ou l'épi cuissard apparaît au-dessous du point *a*.



5e. ordre.

Ces vaches donnent trois pots et demi de lait par jour, et cessent d'en donner lorsqu'elles sont pleines de quatre mois.

La partie inférieure de l'écusson est tout-à-fait restreinte, et ne forme plus qu'un triangle dont le côté inférieur est arrondi vers les trayons. L'équerre est très-basse, son poil est hérissé et gros, ainsi que celui de l'épi qui se trouve à droite de la vulve. Il y a deux épis cuissards formant des échancreurs de chaque côté de l'écusson.



6e. ordre.

Ces vaches donnent deux pots de lait par jour, et cessent d'en donner lorsqu'elles sont pleines de trois mois.

La forme de l'écusson n'est presque plus appréciable, l'équerre est refoulée au bas des cuisses; la branche montante jusqu'à la vulve est plus hérissée et plus large que l'épi de droite.

MOYENNE TAILLE.

1er. ordre.

Les vaches de cette taille et de cet ordre donnent huit pots de lait par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de huit mois.

2e. ordre.

Ces vaches donnent sept pots de lait

par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de sept mois.

3e. ordre.

Ces vaches donnent cinq pots de lait par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de six mois.

4e. ordre.

Ces vaches donnent trois pots de lait par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de cinq mois.

5e. ordre.

Ces vaches donnent deux pots de lait par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de quatre mois.

6e. ordre.

Ces vaches donnent deux pintes de lait par jour et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de trois mois.

PETITE TAILLE.

1er. ordre.

Les vaches de cette taille et de cet ordre donnent dans leur force de lait six pots de lait par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de huit mois.

2e. ordre.

Ces vaches donnent cinq pots de lait par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de sept mois.

3e. ordre.

Ces vaches donnent sept pintes de lait par jour, et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de six mois.

4e. ordre.


Ces vaches donnent quatre pintes de lait par jour et le maintiennent jusqu'à ce qu'elles soient pleines de cinq mois.

5e. ordre.

Ces vaches donnent deux pintes de lait par jour, et cessent d'en donner lorsqu'elles sont pleines de quatre mois.

6e. ordre.

Ces vaches donnent une pinte de lait par jour, et cessent d'en donner lorsqu'elles sont pleines de trois mois.



BATADES.

La bâtarde équerrine se distingue des ordres francs par ce seul caractère: l'épi *e* placé à la droite de la vulve, est

d'un poil hérissé. Ce fait indique la dégénérescence, dans chacun des ordres; elle est plus ou moins grande, suivant la longueur et la largeur de l'écusson et de l'épi, et au maximum quand le montant de l'équerre, à gauche de la vulve, est formé de poil hérissé ainsi que l'épi de droite.

(A continuer.)

Moyen prompt et facile de réduire toute espèce d'herbes en engrais.

Les cultivateurs se plaignent avec raison de la grande quantité de mauvaises herbes, qui, quoique arrachées avec soin et mises en tas ne laissent pas de se reproduire. La graine de la plante arrachée mûrit toujours avant que la plante ne pourrisse; le moindre vent la transporte au loin dans la campagne, l'y fait germer et reparaitre dans les lieux où l'on croyait l'avoir extirpée. Présenter un moyen sûr et facile de se débarrasser de ces plantes incommodes et nuisibles à l'agriculture, c'est rendre aux cultivateurs un grand service.

Faites une couche d'un pied d'épaisseur avec les mauvaises herbes, nouvellement arrachées, saupoudrez-la de chaux vive et remettez dessus une couche d'herbes de la même épaisseur que la première; en continuant de former alternativement une couche d'herbes et un lit de chaux, de façon que la chaux se trouve toujours à la surface du tas, vous parviendrez à réduire en cendre ces plantes qui ne pourront plus donner de la graine, la combustion étant trop prompte, et s'étendant également sur toute la surface des couches. D'ailleurs, l'espace de vingt-quatre heures qu'exige cette opération est beaucoup trop court pour laisser des doutes sur ses bons effets.

Un second avantage de ce procédé c'est que la cendre qu'on en obtient est un excellent engrais pour les terres fatiguées ou épuisées.

Il faut observer que plus la chaux sera récente et l'herbe nouvellement arrachée, plus le résultat de l'opération sera sûr et prompt.

Précautions à prendre quand un cheval a chaud.

L'expérience nous a appris que si dans les grandes chaleurs surtout, un cheval se trouve dans un état de gran-