

rents points de la vaginale; puis on retire successivement la sonde et la canule.

Les résultats sont excellents, et malgré une inflammation assez vive qui peut se prolonger pendant cinq ou six jours, la guérison est généralement obtenue, non par adhérence des deux feuillets de la vaginale, mais par simple modification vitale de cette séreuse; de plus les récidives, si tant est qu'il s'en produise, sont très-rares.

La méthode de Defer peut se résumer ainsi : innocuité complète, efficacité parfaite et exécution facile. (*Bul.gén. de Thérap.*)

Traitement des vomissements opiniâtres dans la grossesse.—Le docteur Welponer rapporte que, d'après la recommandation du docteur Beaun Femald, qui a, plusieurs fois, trouvé ce procédé utile dans la pratique particulière, il a obtenu d'excellents résultats dans trois cas de vomissements opiniâtres dans l'état de grossesse, lesquels avaient résisté à tous les autres remèdes, par l'application d'une solution de nitrate d'argent à 10 pour 100 à la partie vaginale du col de l'utérus. Il maintient en contact la solution pendant cinq minutes et essuie ensuite les parties avec de la ouate; l'application demande à être répétée plusieurs fois dans l'intervalle de deux ou trois jours; le succès a été remarquable.—*Bulletin de thérapeutique.*

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE.

Potion contre la constipation des enfants à la mamelle.—Le Dr LEWIS-SMITH censeille pour les enfants à la mamelle, dont la constipation est quelquefois si persistante, une préparation qui, ajoutée au lait, le rapproche de la composition du colostrum si manifestement purgatif :

Huile de foie de morue.....	2 parties.
Eau de chaux	} aa. 1 partie.
Sirop de lactophosphate de chaux.	

Un quart ou une demi-cuillère à thé sont donnés avant chaque tétée; ou bien on donne une cuillerée à thé trois fois