


ène-diamine (Hoffmann), à l'*éthylénimine* (Ladenburg et Abel), à la *pipérazidine* (Schering). Son nom lui a été donné par Sieber. Sa formule de constitution établie par Hoffman est :



C'est à tort qu'on l'a appelée la *dispermine*, car la *spernine* de Schreiner n'a pas pour formule $\text{C}^2 \text{H}^5 \text{Az}$ mais $\text{C}^{10} \text{H}^{26} \text{Az}^4$ (Loehli).

Parmi les composés de la pipérazine, il faut citer le chlorhydrate, le chloroplatinate et surtout l'urate. Ce dernier est des plus importants pour le médecin, car il est le plus soluble de tous les urates connus. Il se dissout, en effet, dans 50 parties d'eau à 17°, tandis que l'urate de lithine en exige 367 à 20° et celui de soude 1260 à 15°.

Cette propriété explique pourquoi la pipérazine est employée avec succès pour combattre la diathèse urique : goutte, gravelle, lithiase rénale. Les résultats obtenus en Allemagne, en Angleterre, en France, sont très remarquables. Faut-il espérer, avec M. Attaix, qu'on pourra dissoudre les calculs d'acide urique et d'urate de soude par des lavages vésicaux, à l'aide d'une solution chaude de pipérazine à 2 0/0 qui est très bien tolérée ? L'avenir peut répondre rapidement si l'expérimentation est faite avec soin.

M. Tison qui a indiqué ce sujet de thèse à son interne, M. Attaix, a observé que la pipérazine a une action curative rapide sur la blennorrhagie aiguë et chronique ainsi que sur la cystite purulente.

On l'administre ordinairement à la dose quotidienne de 60 centigrammes à deux grammes dans de l'eau de Seltz ou dans de l'eau de Vals suffisamment gazeuse (les perles, etc.) Quelques médecins ont beaucoup dépassé sans inconvénient cette dose qui est cependant suffisante.

Tel est résumé aussi rapidement que possible cet excellent travail destiné à prendre une place honorable dans les recueils de thérapeutique.

DARTEYRE.—Grande Librairie Médicale, A. Maloine, Place et Rue de l'Ecole-de-Médecine, 21-23-25, Paris, vient de paraître. —Le *Lysol*, ses propriétés antiseptiques, thérapeutiques et désinfectantes, par le Dr DARTEYRE, ex-interne à l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, ancien prosecteur à l'Ecole-de-Médecine de Clermont-Ferrand.—Thèse in-8°.—Prix : 3 fr. 50.

BOURNEVILLE.—*Recherches Cliniques et Thérapeutiques sur l'Épilepsie, l'Hystérie et l'Idiotie.* Compte rendu du service des enfants idiots, épileptiques et arriérés de Bicêtre pour l'année 1895 ; par BOURNEVILLE.

Avec la collaboration de MM. BONNCOURT, COMTE, DARDEL, DUBARRY, LERICHE, LOMBARD, LE NOIR, PILLIET, RUEL, SOLLIER et TISSIER, internes ou anciens internes du service.

Tome XIV. Un beau volume in-8° de LXXI-254 pages, avec 31 figures et 8 planches hors texte.—Prix : 6 fr.

DOYEN.—*Traitement des Suppurations pelviennes, de l'Hystérectomie abdominale totale, traitement chirurgical, des rétrodéviations utérines, du meilleur mode de fermeture de la paroi abdominale,* par Eugène DOYEN.—Tiré à part des Archives provinciales de chirurgie.—Institut international de bibliographie scientifique, 14 Boul. St-Germain, Paris, 1896.

KEELEY, Leslie E.—*The non-heredity of Inebriety,* by Leslie E. KEELEY, M. D. L.L.D. Scott Foresman & Co., Chicago.—Oct. 359 pages.

Hirschfelder. The treatment of Tuberculosis and other infectious diseases with Oxytoxines. a provisional report by S. O. Hirschfelder M. D. San Francisco, Cal.

PARIZEAU.—L'arthrite blennorrhagique aiguë et son traitement par l'arthrotomie précoce, par le Dr Téléphore PARIZEAU.