

Quand le malade m'a fait l'histoire de ses fistules, leur mode d'apparition, je m'en doutais, je l'ai trouvé. Voici comment.—En mettant le sujet dans la position de la taille (autrement on se trompe) j'ai exploré la pulpe du doigt dirigée en arrière et non sur la prostate, j'ai constaté l'existence d'une bride, à trois centimètres de l'anus, diminuant le calibre du rectum, occupant la moitié de sa circonférence postérieure et qui m'a fait l'effet d'une grosse ficelle. Notez que la muqueuse est tout à fait intacte. En examinant plus haut le doigt contourne cette ficelle, par derrière, et tombe à pic dans une énorme excavation. Voilà ce que je trouve aujourd'hui encore chez cet homme, d'une façon typique.

Il n'est pas étonnant que le rectum soit dilaté au-dessus d'un tel obstacle, que la forme de ces matières soit triangulaire, le rétrécissement partiel du rectum que j'ai décrit il y a quelques années, donne cet aspect aux fécès.

Vous allez me demander d'où vient cette bride, je vous dirai que cette bride présente toujours les mêmes caractères, qu'elle accepte toujours le même siège, qu'il y a une identité parfaite dans tous les cas, surtout comme siège. Il faut donc qu'il y ait une cause toujours la même; on peut l'expliquer de la manière suivante :

Je vous rappelle que le rectum se développe séparément de l'anus. Celui-ci ou mieux la portion anale du rectum se creuse dans le blastème et finit par rejoindre le rectum et se confondre avec lui. Que cette résorption s'arrête, il en résulte un *rétrécissement* ou une absence partielle ou totale de la portion anale. Toutes les malformations de l'anus s'expliquent par là. Dans l'imperforation anale, par exemple, tout le blastème s'est résorbé excepté en haut. Je ne peux pas rattacher à d'autres causes la production de cette bride qui siège toujours au même endroit. C'est de la théorie, mais il n'y a pas d'autre cause que celle là se rattachant à la persistance d'une portion de blastème et qui ne gêne pas plus pendant des années le porteur d'une affection semblable.—

En second lieu, cette bride est-elle la cause des fistules, ou en serait-elle l'effet ?

Causés des fistules, en général : tuberculose, syphilis, hémorroïdes, rétrécissements quelconques. Chez notre individu, pas de tuberculose, pas de lésions organiques. La syphilis n'y est pour rien.—

J'affirme que la bride est la cause, j'en suis certain par l'histoire de malades que j'ai vus et opérés. J'en ai reproduit un cas dans mon anatomie