

- 2° Hernie inguinale, 4. Cure radicale.
- 3° Eventration consécutive à une ovariectomie datant de quatre ans, appendicite chronique. Ablation de la cicatrice, appendicectomie et suture de la paroi en quatre plans.
- 4° Appendicite à froid, 3. Appendicectomie.
- 5° Appendicite pendant l'accès, 2. Appendicectomie, drainage.
- 6° Fistule consécutive à une appendicectomie, 1. Ouverture, ablation d'un calcul.
- 7° Cancer du cæcum, 1 Entéro-anastomose. Mort de choc opératoire quatre jours après l'intervention.
- 8° Cancer du foie avec compression des canaux biliaires par ganglions, 1. Cholécysto-entérostomie.

*Chirurgie des organes génitaux de la femme.*

- 1° Kyste de la grande lèvre droite, 1. Ablation.
- 2° Métrite, 3. Curettage.
- 3° Métrite et col conique, 1. Curettage, amputation du col (procédé de Jayle).
- 4° Infection puerpérale, 1. Curettage, injection intra-veineuse de collargol.
- 5° Retention placentaire, 1. Curage digital.
- 6° Déchirures du col, kystes de Naboth et métrite, 1. Curettage, amputation du cc (procédé de Jayle)
- 7° Métrite et rétroversion, 1. Curettage, suspension.
- 8° Ovaires kystiques, 2. Ovariectomie.
- 9° Kystes multiloculaires des œufs ovaires. Ovariectomie double.
- 10° Métrorrhagies et adhérences intestinales. Dissection des adhérences et hystérectomie.
- 11° Gros kyste du ligament large. Hystérectomie sub totale. Mickulitz. Mort trois jours après l'intervention.

*Chirurgie des organes urinaires de la femme. et génito-urinaires de l'homme.*

- 1° Tuberculose rénale, 3. Cystoscopie.
- 2° Hydronéphrose intermittente, 1. Fixation du rein.
- 3° Hydrocèle droit, 1. Retourneement de la vaginale.
- 4° Hypertrophie de la prostate, 1. Prostatectomie (procédé de Freyer). Mort d'anurie 36 heures après l'opération.

*Chirurgie de l'anus et du rectum*

- 1° Hémorroïdes, 1. Dilatation anale et volatilisation des hémorroïdes au thermocautère.