

169a. Oie-de-neige (*C. h. nivalis*)—

Le 28 août 1908, nous vîmes une troupe de ces oiseaux sur la grève de Winter-Harbour.

173. Bernache (*Branla bernicla glaucogastra*)—

Cette espèce d'oie abonde à Winter-Harbour où, apparemment, elle niche. Il en arrive vers le 3 juin, et tout de suite elles recherchent les mares d'eau douce des dépressions du sol.

222. Phalarope roux (*Crymophilus fulcarius*)—

Ces oiseaux arrivent à Winter-Harbour vers le 1er juin. Nous en avons vus aussi à l'île Dealy, en même temps que des sanderlings, 31 août 1909.

234. La maubèche pourprée (*Tringa canutus*)—

La maubèche pourprée arrive à Winter-Harbour vers le 1er juin. D'après ce que nous avons vu de ces oiseaux ils nichent, évidemment, dans cette localité, où ils sont assez abondants sans que, cependant, on les voie jamais par grandes troupes. A l'encontre de la plupart des oiseaux de cette famille les maubèches pourprées se tiennent plutôt sur les terrains élevés que sur les terrains bas.

240. La maubèche-à-croupion-blanc (*Actodromas fuscicollis*)—

Nous avons vu un certain nombre de ces oiseaux à Winter-Harbour, durant les mois de juin, juillet et août. Ils nichent sur l'île de Melville.

241. La maubèche-Baird (*Actodromas bairdi*)—

Cette maubèche niche aussi à Winter-Harbour où nous l'avons vue fréquemment.

248. Sanderling (*Calidris arenaria*)—

Cet oiseau est commun à Winter-Harbour, où il niche. Nous l'avons vu aussi à l'île Dealy, dans le golfe de Cumberland et dans le détroit d'Hudson. Il arrive à Winter-Harbour vers le 1er juin.

262. La maubèche commune (*Tryngites subruficollis*)—

Nous avons vu deux paires de ces maubèches à Winter-Harbour, où ces oiseaux nichent évidemment. Ils arrivent vers le 5 juin.

270. Pluvier à ventre noir (*Squatarola squatarola*)—

Nous en vîmes une troupe à Winter-Harbour le 6 juillet 1909.