

aggraver l'état du malade. — La seule chose qui devrait être immédiatement faite, et cela sur le lieu même de l'accident, avant tout transport, serait une injection sous-cutanée de morphine de 1 centigramme. Une semblable injection ayant pour triple effet, d'atténuer considérablement les douleurs si elles existent, d'immobiliser les intestins dès le début, et de mettre le patient dans un état de torpeur qui facilitera son transport en le rendant moins disposé à s'aider par des mouvements et des contractions essentiellement dangereuses de sa paroi abdominale.

Autant que cela se pourra le médecin devra accompagner son blessé jusqu'au lieu où il a décidé qu'il serait transporté, et demeurera dans la chambre pendant qu'on le déshabille et qu'on le couche. Je voudrais qu'il use de son autorité pour faire porter directement le blessé du brancard sur le lit, sur lequel une fois couché il sera déshabillé. Il défendra formellement qu'on le fasse asseoir pour lui enlever sa chemise, ordonnant plutôt que celle-ci soit coupée avec des ciseaux s'il est impossible de l'enlever autrement. La difficulté de faire respecter ces règles est d'autant plus grande que le malade souffre moins, ou étant plus énergique résiste davantage à la souffrance.

Une fois couché, la température et le pouls seront pris et soigneusement notés, et la vessie sera sondée.

J'insiste spécialement sur ce fait, il faut vider la vessie, et il faut la vider par cathétérisme et non faire uriner le malade ce qui entraînerait fatalement une contraction de la paroi. Il faut d'autre part sonder la vessie afin de se rendre compte immédiatement si l'urine contient du sang, d'autre part en renouvelant la cathétérisme neuf heures plus tard on pourra savoir d'une façon certaine s'il y a *oligurie* ou *anurie*, constatation d'une extrême importance.

Si le malade est en état de choc, on veillera naturellement à ce qu'il soit réchauffé et suivant son état on procèdera immédiatement à une injection d'éther, de caféine, ou de spartéine, et même à une injection immédiate de 500 grammes de sérum artificiel sous la peau. Cette dernière injection aura le