

Hémorrhagies	<i>Evitez de panser la plaie avec du perchlorure de fer, du vinaigre, des toiles d'araignées; — à prendre les premiers chiffons qui tombent sous la main et peuvent être souillés.—Eviter de remuer, de transporter le blessé avant l'arrivée du médecin.</i>	Adaptez sur la plaie un linge très propre plié en plusieurs doubles, et le maintenez exactement avec l'extrémité des doigts; — si l'hémorragie persiste, liez le membre au-dessus de la plaie; — bande hémostatique en caoutchouc. Pour arrêter un saignement de nez: élevé brusquement le bras du côté correspondant à la narine qui saigne, le maintenir quelques minutes dans cette position. — Appliquer compresses d'eau froide sur le front; — introduire dans la narine un morceau d'ouate pure et presser pendant quelques instants; — repos; air frais.
Pendaison	<i>Evitez tout retard pour couper la corde.</i>	Couchez le malade.—Eau froide au visage; inhalations aromatiques; — frictions sur le corps; respiration artificielle. Si la face est rouge, congestionnée, glace sur la tête, sinapismes aux membres inférieurs.
Asphyxie	<i>Evitez les lits chauds, l'exposition au soleil, la respiration des vapeurs irritantes.</i>	Exposez le malade au grand air.—Enlevez les vêtements; — frictions sur le corps; eau au visage; — flagellations; — respiration artificielle.
Syncope	<i>Evitez de mettre le malade sur son séant, la tête baissée.</i>	Couchez le malade sur un plan horizontal: la tête basse; — lui élever les bras; — desserrez les vêtements; air frais; — eau froide au visage; — mettez sous les narines du vinaigre; éther; — flagellation; — respiration artificielle.
Ivresse		Faites vomir le patient par la titillation de la luette et l'emploi de l'eau tiède; donnez-lui par gorgées, à quelques minutes d'intervalle, un verre d'eau sucrée, avec addition d'une cuillerée à thé d'acétate d'ammoniaque.