

Eupatorium ericoides capitis bonaë spei. *Breyn. cent.*
t. 69. Morif. hist. 3. p. 97. f. 7. t. 18. f. 10.

Abrotanoides capensis, ericae folio. *Pet. gaz. 9. t. 5.*
f. 2.

Houttuyn Lin. *Pfl. Syst. 4. p. 440.*

Braune Stoebe. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ. (v. f.)

Flores uniflori, terminales, sessiles, fasciculati.
 Caules distorti, ramosi, flexuosi. Folia cinerea,
 mutica.

* 15. STOEBE *virgata.*

S. foliis linearibus muticis tomentosis, spicis terminali-
 bus. *Thunb. prod. 170.*

Ruthenförmige Stoebe. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ. (v. f.)

* 16. STOEBE *aspera.*

S. foliis linearibus muticis glabris reflexis, capitulis la-
 teralibus. *Thunb. prod. 170.*

Scharfköpfige Stoebe. W.

Habitat ad Cap. b. spei. ḥ.

* 17. STOEBE *pafferinoides.* W.

S. foliis oblongis subtus tomentosis adpressis, floribus
 racemoso - spicatis. W.

Seriphium (*pafferinoides*) foliis minimis acerosis ad-
 pressis, ramulis tomentosis filiformibus, floribus race-
 mosis. *Lamarck encycl. 1. p. 269.* *

Pafferinaartige Stoebe. W.

Habitat in insula Mauritii et Borboniae. ḥ. (v. f.)

18. STOEBE *Rhinocerotis.*

S. foliis filiformibus muticis glabris, ramulis tomento-
 sis. *Thunb. prod. 170.*

S. foliis triquetris adpressis, ramulis tomentosis cernuis,
 racemis proliferis. *Lin. suppl. 391.*