

Le *zizyphus* de Rome, avec de très petites épines, était trop chétif, mais d'une végétation plus avancée. Cet avancement tient à ce que l'hiver 1865-1866, ayant été très sec à Rome, était plus favorable aux plantes de la Syrie. Les feuilles avaient commencé à se développer avant la fin de mars, tandis qu'on n'en voyait aucune sur les autres *ramnus*.

Les épines du *zizyphus vulgaris*, indigène à Rome, sont plus grandes que celles du *spina Christi* qui paraissent en être la reproduction en miniature ; les premières ont 20 millimètres de longueur ($\frac{3}{4}$ de pouce), les secondes en général 10 millimètres ; mais dans un pays plus chaud, dans sa patrie, cette plante doit avoir des épines plus grandes et plus fortes qu'en Europe..

FORME DE LA COURONNE.

Les branches du *zizyphus spina Christi* ou *jujubier* brisées ou courbées vers le milieu pour prendre la forme d'un bonnet, *pileus*, étaient fixées par chacune de leurs extrémités, soit en dedans, soit au dehors du cercle de joncs, de celui sans conteste que nous avons à Paris. Il fallait que le cercle fût plus grand que le tour de la tête, afin de pouvoir l'y faire entrer, malgré le rétrécissement causé par l'introduction des branches ; et l'on trouve en effet que la Couronne de Notre-Dame placée seule sur la tête tomberait sur les épaules. On n'avait pas même besoin de nouveaux liens pour les fixer.