

leront sur ces lisières de fondation et les construiront en gâteaux durant ces quatre jours. Elles y déposeront le miel contaminé qu'elles ont emporté, des vieux gâteaux. Alors, le soir du quatrième jour, enlevez ces nouveaux gâteaux, et donnez leur à travailler des cadres remplis de feuilles entières de fondation, et la guérison sera complète.

Par cette méthode de traitement, tout le miel contaminé est enlevé de la portée des abeilles, avant qu'elles ne commencent l'ouvrage sur les feuilles entières de fondation.

Lorsque vous trouvez une grande quantité de beau couvain et seulement quelques cellules loqueuses, dans la plus grande partie de vos colonies, et que vous avez traité vos abeilles comme ci-dessus, remplissez deux ruches de ces gâteaux de couvain, et placez ces ruches l'une sur l'autre; mettez-les à l'ombre du soleil, jusqu'à ce que la plus grande partie du couvain soit éclos.

Alors, *le soir*, secouez ces abeilles, dans une ruche vide et donnez-leur des cadres garnis d'une lisière de fondation et laissez-les bâtir les gâteaux durant quatre jours. Alors, *le soir du quatrième jour*, ôtez-leur ces gâteaux et donnez-leur des cadres garnis d'une feuille entière de fondation à travailler, pour obtenir la guérison complète.

Après que le couvain des vieux gâteaux est éclos, ces derniers doivent être convertis en cire ou brûlés, et tous les gâteaux faits sur les lisières de fondation durant les quatre jours doivent aussi être convertis en cire ou brûlés, à cause du miel contaminé qu'ils pourraient renfermer.

Lorsque les colonies malades sont faibles en abeilles, mettez-en deux, trois ou quatre ensemble, de manière à avoir un essaim de bonne grosseur pour commencer le traitement, car ça ne paye pas de passer son temps à traiter des colonies faibles.

Tout traitement de colonies malades doit être fait **le soir**, afin de ne pas avoir de pillage et empêcher que