

ayant la pupille de l'œil dilatée, le nez rouge ou violet, saignez-le de suite. Faites dissoudre 2 onces de sel à médecine dans un demiard d'eau chaude, donnez-lui-en la moitié un matin et le reste, le matin suivant.

ARAIGNÉE — MAMMITE DES BREPS

Engorgement des mamelles des brebis nourrices.

Symptômes : — Mamelles enflées et douloureuses.

Causes : — Malpropreté, bergeries trop chaudes, coups de têtes donnés par les agneaux en tétant, trop grande abondance de lait qui a séjourné trop longtemps dans la mamelle.

Traitement : — Dès le début, et tant que le pis est rouge, enflammé, lavez-le 4 à 5 fois par jour avec une décoction de mauve ou de graine de lin, graissez le pis abondamment avec du saindoux amolli par la chaleur. Videz le pis fréquemment à la main, mais si ce dernier est tellement sensible que la brebis refuse de donner son lait à cause de la douleur occasionnée par les tractions sur les tétines, videz le pis avec la *Sonde trayeuse du D Gombault*, voir page 214. S'il reste de la dureté lorsque la douleur a été calmée, il faut cesser l'emploi des émollients, c'est-à-dire la décoction de guimauve, le saindoux et les cataplasmes et remplacer ces derniers par de l'onguent d'*iodure de potassium* (25 ets la boîte), ou, faute de ce remède, essayer les frictions avec le mélange suivant, qui a réussi dans bien des cas :

Essence de térébenthine. 4 onces

Saindoux. 4 onces

Si, malgré tous ces soins, il se forme du pus, suivez le traitement des *Abcès*, page 13.

Il arrive parfois que la maladie marche rapidement et présente une tendance à se terminer par la *gangrène*. Dans ce cas-là suspendez les émollients, lavez le pis avec une chopine d'eau mêlée avec une roquille de vin rouge. Si la gangrène est superficielle, enlevez au couteau les parties mortifiées et graissez les plaies avec la *Pommade phéniquée*, voir page 215. Si la gangrène s'est étendue vers l'aine, il n'y a pas de guérison possible. Aussitôt que vous vous apercevez qu'il y a commence-