

病臟心與童兒




心臟病可分

健康生活



出刊四期星達。

幾歲



兒童

育兒室

長到三

周歲左

右，乳

母子用兩根毛軸軟

的兒童牙刷，家長要教給他們

刷牙的刷牙方法。開始學刷牙

時可用牙膏，待掌握刷牙要

領後再用。牙膏用量宜少，可選用帶水果香

味的牙膏。每早早晚和晚上各刷牙一次，要

養成習慣。

美。每天早晚刷牙，但也要保

持口腔衛生，例如在哺乳或進食後，漱一

口，並漱水。

開水。

未有過傳播向，但確切的病因至今尚

多解。

幼年型風濕性關節炎的病程變化

多端：部分患者的小風濕病能長期得到及

時病情持穩發展，引起關節不同程度

的畸形和良好的護理，多數患者能完

年人，也能使成人明顯，除關節疼痛、腫

脹痛、貧血、血沉增快、白血球升高

等，少數患者還有胸膜炎、心包炎和

肺炎。此病多見於女孩，其發生與氣

免疫反應有關，感染可能是誘發因素

或發得很厲害，偶然才

那就冒險兒童心臟病患

者相當多，但由於各個

種類各有差異，因此，期動手術，有的在六歲

以後才能施行手術。

人所患的心臟病性質，並沒

有些小孩子適合在幼兒

以後才能施行手術。

開始，

刷牙

時可用牙膏，待掌握刷牙要

領後再用。牙膏用量宜少，可選用帶水果香

味的牙膏。每早早晚和晚上各刷牙一次，要

養成習慣。

美。每天早晚刷牙，但也要保

持口腔衛生，例如在哺乳或進食後，漱一

口，並漱水。

開水。

未有過傳播向，但確切的病因至今尚

多解。

幼年型風濕性關節炎的病程變化

多端：部分患者的小風濕病能長期得到及

時病情持穩發展，引起關節不同程度

的畸形和良好的護理，多數患者能完

年人，也能使成人明顯，除關節疼痛、腫

脹痛、貧血、血沉增快、白血球升高

等，少數患者還有胸膜炎、心包炎和

肺炎。此病多見於女孩，其發生與氣

免疫反應有關，感染可能是誘發因素

或發得很厲害，偶然才

那就冒險兒童心臟病患

者相當多，但由於各個

種類各有差異，因此，期動手術，有的在六歲

以後才能施行手術。

開始，

刷牙

時可用牙膏，待掌握刷牙要

領後再用。牙膏用量宜少，可選用帶水果香

味的牙膏。每早早晚和晚上各刷牙一次，要

養成習慣。

美。每天早晚刷牙，但也要保

持口腔衛生，例如在哺乳或進食後，漱一

口，並漱水。

開水。

未有過傳播向，但確切的病因至今尚

多解。

幼年型風濕性關節炎的病程變化

多端：部分患者的小風濕病能長期得到及

時病情持穩發展，引起關節不同程度

的畸形和良好的護理，多數患者能完

年人，也能使成人明顯，除關節疼痛、腫

脹痛、貧血、血沉增快、白血球升高

等，少數患者還有胸膜炎、心包炎和

肺炎。此病多見於女孩，其發生與氣

免疫反應有關，感染可能是誘發因素

或發得很厲害，偶然才

那就冒險兒童心臟病患

者相當多，但由於各個

種類各有差異，因此，期動手術，有的在六歲

以後才能施行手術。

開始，

刷牙

時可用牙膏，待掌握刷牙要

領後再用。牙膏用量宜少，可選用帶水果香

味的牙膏。每早早晚和晚上各刷牙一次，要

養成習慣。

美。每天早晚刷牙，但也要保

持口腔衛生，例如在哺乳或進食後，漱一

口，並漱水。

開水。

未有過傳播向，但確切的病因至今尚

多解。

幼年型風濕性關節炎的病程變化

多端：部分患者的小風濕病能長期得到及

時病情持穩發展，引起關節不同程度

的畸形和良好的護理，多數患者能完

年人，也能使成人明顯，除關節疼痛、腫

脹痛、貧血、血沉增快、白血球升高

等，少數患者還有胸膜炎、心包炎和

肺炎。此病多見於女孩，其發生與氣

免疫反應有關，感染可能是誘發因素

或發得很厲害，偶然才

那就冒險兒童心臟病患

者相當多，但由於各個

種類各有差異，因此，期動手術，有的在六歲

以後才能施行手術。

開始，

刷牙

時可用牙膏，待掌握刷牙要

領後再用。牙膏用量宜少，可選用帶水果香

味的牙膏。每早早晚和晚上各刷牙一次，要

養成習慣。

美。每天早晚刷牙，但也要保

持口腔衛生，例如在哺乳或進食後，漱一

口，並漱水。

開水。

未有過傳播向，但確切的病因至今尚

多解。

幼年型風濕性關節炎的病程變化

多端：部分患者的小風濕病能長期得到及

時病情持穩發展，引起關節不同程度

的畸形和良好的護理，多數患者能完

年人，也能使成人明顯，除關節疼痛、腫

脹痛、貧血、血沉增快、白血球升高

等，少數患者還有胸膜炎、心包炎和

肺炎。此病多見於女孩，其發生與氣

免疫反應有關，感染可能是誘發因素

或發得很厲害，偶然才

那就冒險兒童心臟病患

者相當多，但由於各個

種類各有差異，因此，期動手術，有的在六歲

以後才能施行手術。

開始，

刷牙

時可用牙膏，待掌握刷牙要

領後再用。牙膏用量宜少，可選用帶水果香

味的牙膏。每早早晚和晚上各刷牙一次，要

養成習慣。

美。每天早晚刷牙，但也要保

持口腔衛生，例如在哺乳或進食後，漱一

口，並漱水。

開水。

未有過傳播向，但確切的病因至今尚

多解。

幼年型風濕性關節炎的病程變化

多端：部分患者的小風濕病能長期得到及

時病情持穩發展，引起關節不同程度

的畸形和良好的護理，多數患者能完

年人，也能使成人明顯，除關節疼痛、腫

脹痛、貧血、血沉增快、白血球升高

等，少數患者還有胸膜炎、心包炎和

肺炎。此病多見於女孩，其發生與氣

免疫反應有關，感染可能是誘發因素

或發得很厲害，偶然才

那就冒險兒童心臟病患

者相當多，但由於各個

種類各有差異，因此，期動手術，有的在六歲

以後才能施行手術。

開始，

刷牙

時可用牙膏，待掌握刷牙要

領後再用。牙膏用量宜少，可選用帶水果香

味的牙膏。每早早晚和晚上各刷牙一次，要

養成習慣。

美。每天早晚刷牙，但也要保

持口腔衛生，例如在哺乳或進食後，漱一

口，並漱水。

開水。

未有過傳播向，但確切的病因至今尚

多解。

幼年型風濕性關節炎的病程變化

多端：部分患者的小風濕病能長期得到及

時病情持穩發展，引起關節不同程度

的畸形和良好的護理，多數患者能完

年人，也能使成人明顯，除關節疼痛、腫