

fameux fil d'Ariadne pour sortir du labyrinthe dans lequel je me trouve perdu !

Plein de ce consolant espoir je poursuivis avec une fiévreuse curiosité l'inventaire de toutes les tumeurs qui peuvent se développer dans les régions abdominale et pelvienne.

Il va sans dire que je portai mon attention d'une manière toute particulière aux états pathologiques offrant le plus grand nombre de points de contact avec celui de la femme-Séguin.

Je vous ai déjà laissé entrevoir que je ne croyais pas avoir affaire à un abcès ; mais il est très-possible d'avoir à y reconnaître un abcès chronique, indolent, communément appelé un *abcès froid*, et dont l'origine pourrait m'échapper par l'insuffisance des renseignements donnés par la malade ; dans tous les cas la fluctuation très-grande qu'il y a ébranle quelque peu ma foi ; je crois me surprendre dans l'embarras du doute—Et Nysten dit que le diagnostic en est souvent obscur.

Je me sens plus à l'aise en étudiant le *thrombus* ou cette tumeur sanguine qui peut naître dans le tissu cellulaire de la cloison recto-vaginale ; en effet il arrive assez souvent, à ce qu'il paraît, que cette tumeur devient molle et fluctuante quand ce tissu cellulaire est déchiré et qu'il y existe un foyer ; à cet état de développement les symptômes peuvent en imposer ; mais il paraît que l'apparition brusque et le développement rapide de cette maladie, les douleurs violentes qui l'accompagnent suffisent toujours pour la faire reconnaître.

D'ailleurs une tumeur liquide, qu'elle renferme du sang ou du sérum, disparaît par certains changements de position, circonstance qui tranche le diagnostic suivant quelques auteurs.

Parmi les autres tumeurs qui peuvent se développer dans le tissu cellulaire du petit bassin, il est à noter des masses graisseuses, fibreuses ou cancéreuses et des tumeurs enkystées. Ces productions étrangères se trouvent habituellement