

aussi des représentants dans nos eaux, cependant on n'a encore signalé d'une manière certaine la présence d'aucun. Nous bornant aux trois premiers ordres, voici par quels caractères on peut les diviser les uns des autres.

- Ventrales en arrière des pectorales..... II. ABDOMINAUX.
 Ventrales au dessous ou en avant des pectorales. III. SUBBRANCHIENS.
 Ventrales nulles IV. APODES.

II. Ordre. LES ABDOMINAUX. *Abdominales.*

Ventrales en arrière des pectorales et non attachées aux os de l'épaule.

Cet ordre, dont tous les sujets, tant ceux d'eau douce que ceux d'eau salée, sont recherchés pour la table, se subdivise en six familles, qu'on peut diviser les unes des autres par les caractères suivants :

- Ecailles o 1. SILUROIDES.
 Ecailles présentes ;
 Bouche disposée en suçoir ;
 Mâchoires sans dents 11. CYPRINOIDES.
 Mâchoires armées de dents. III. CYPRINODONTIDES.
 Bouche non conformée en suçoir ;
 Mâchoires allongées, dents longues et
 aiguës IV. ESOCIDES.
 Mâchoires ordinaires ;
 Une 2e dorsale charnue. V. SALMONIDES.
 Point de 2e dorsale VI. CLUPÉIDES.

I. Fam. des SILUROIDES. *Siluroidæ.*

Peau nue, sans écailles, limoneuse. Tête déprimée, large, le plus souvent avec plusieurs barbillons près de la bouche. Souvent une deuxième dorsale charnue se montre sur le dos. La nageoire dorsale et les pectorales supportées par une épine forte, articulée, à mouvements multiples.

Cette famille se borne pour nous au seul genre Pimélode, qui renferme un assez grand nombre d'espèces, encore assez mal définies et qui requerraient une étude particulière pour être définitivement fixées. Nous signalons les 5 suivantes comme se rencontrant dans nos eaux.