

LE LOCO (OXYTROPIDE)—

Les plantes qui appartiennent à la famille du loco affectent tous les animaux domestiques. Il y en a deux variétés, le loco à fleurs pourpres et le loco à fleurs blanches, qui produisent une maladie spéciale. Le loco à fleurs pourpres est une plante basse, retombante, à fleurs pourpres, tandis que la variété blanche est à pousse droite et a une fleur blanche visible. Les victimes de cette plante se remettent lorsqu'elles sont bien nourries. On peut hâter la guérison au moyen d'un émétique ou d'un purgatif pour diminuer l'irritation de l'estomac.

LA CIGUË—

La ciguë peut causer des ravages sérieux dans un troupeau. Le poison de la ciguë se trouve dans la racine. Dans les circonstances ordinaires, les tiges ne sont pas vénéneuses et dans le foin ni les tiges ni les graines ne sont une source de danger. On ne peut pas faire grand'chose pour des animaux empoisonnés mais un émétique peut donner un soulagement temporaire.



Chèvre Angora.

L'ASTER LIGNEUX—

L'aster est fatal aux chèvres comme aux moutons. On ne la trouve que sur les terrains argileux contenant de l'alcali. De 90 à 100 pour cent des animaux affectés meurent. Aucun traitement n'a réussi jusqu'ici. Le berger doit éviter les terrains où pousse l'aster, surtout lorsque les chèvres ont faim.

EGLANTIER—

Un autre ennemi de la chèvre, et spécialement des animaux jeunes et faibles, est l'églantier grim pant ordinaire, recouvert d'épines fortes. L'animal se prend dans ces épines et y reste captif. Si on ne le découvre pas pour le mettre en liberté, il meure au bout de quelques jours.