règles prescrites. Dès que ce pansement est terminé, relevez le lambeau et suturez-le tel qu'indiqué au schéma (fig. 2).

Dans le cas de désarticulation que j'ai faite, je n'ai été obligé de ligaturer que les vaisseaux fémoraux. Il faut bien se rappeler que j'ai opéré sur un malade dont les vaisseaux étaient peu développés, puisque cet enfant n'avait que six ans et demi. Tout de même, je suis convaincu que si j'eusse suivi les procédés classiques, il m'aurait fallu appliquer un bien plus grand nombre de ligatures.



Fig. 1.

Fig. 2.

Par ce procédé si facile et si sûr, cette opération peut être exécutée en trente secondes. Le temps de l'opération est trop court pour nous faire redouter une hémorrhagie grave par régurgitation.

L'hémorrhagie directe n'est guère plus à redouter par mon procédé, tandis qu'elle a toujours été la terreur des chirurgiens dans les autres procédés—terreur bien grande, paraît-il, puisque Syme a failli en perdre momentanément la tête.

Pourquoi n'est-elle pas à craindre? Voici: En comprimant les vaisseaux fémoraux sur l'éminence iléo-pectinée, ou en les ligaturant préalablement, vous ischémiez toute la face antérieure, latérale, externe et même l'interne et la postérieure. En effet, en arrêtant le courant sanguin dans l'artère fémorale, vous fermez la voie à l'hémorrhagie dans presque tous les vaisseaux de la région supérieure de la cuisse, excepté l'obturatrice et la sciatique. Or, par mon procédé, vous n'atteignez ces dernières artères que dans leurs subdivisions insignifiantes. Pour vous en convaincre, il suffit de vous rappeler que les branches de l'obturatrice, l'externe exceptée, se rendent à la racine des adducteurs qu'elles nourrissent, et qu'elles descendent à peine à 0 m. 10 au-dessous du périnée. Avec mon procédé, devons-nous redouter la sciatique qui est une nuisance sérieuse dans les autres modes opératoires? Non, certainement, puisqu'elle ne peut être atteinte que dans ses anastomoses avec quelques petites branches de la circonflexe interne et les artérioles des perforantes qui sont impuissantes à apporter leur contingent à l'hémorrhagie à cause de la ligature de la fémorale.