## 2. Gen. TAUTOGUE. Tautoga, Dekay.

Mâchoires munies d'une double rangée de dents. Opercules et préopercules sans denticulations ni épines, et nus ou avec des écailles peu nombreuses.

Une seule espèce.

Le Tautogue d'Amérique. Tautoga Americana, Dek.; Tinigra, Mitch.; Labrus Americanus, Storer.—Angl. The Tautog; Blak fish.—Longueur 6 à 18 pouces.

Formule ptérygiale: D. 28; P. 15; V. 6; A. 11, C. 15.

Corps arqué régulièrement depuis le museau jusqu'à l'extrémité de la dorsale. Couleur ordinairement d'un noir bleuûtre sur le dos varié de bandes et de taches plus foncées; ventre blanchâtre. Pupilles noires, iris argentées.

Dorsale vis à vis les pectorales, avec 17 rayons épineux portant des filaments libres à leur base.

Ventrales peu en arrière des pectorales, foncées en dessus, blanches en dessous; les rayons extérieurs épineux.

Anale vis-à-vis les derniers rayons épineux de la dorsale, ses trois premiers rayons épineux. Caudale à l'extrémité presque droite.

Comme ce poisson est très abondant sur les côtes da Massachusetts, nous pensons qu'il doit se rencontrer aussi dans notre Golfe, bien que nous n'en ayons d'autre preuve que des descriptions fort équivoques que nous en ont données des pêcheurs. Mr. Fortin ne le mentionne pas parmi ceux qu'il a rencontrés.

C'est surtout à Plymouth et à Wellsleet qu'on fait en grand la pêche du Tautogue pour en approvisionner les marchés de Boston et de New-York.

Ce poisson est jugé d'ordinaire l'égal du Chogset, mais il a de plus l'avantage de pouvoir être salé, et c'est alors un mets de recherche pour les gourmets.

On en a pris qui pesaient jusqu'à 15 livres, mais généralement son poids varie de une à deux livres.

## III. Gen. CORB. Corvina, Cuvier.

Dos portant une convexité très prononçée en arrière de la tête. Bouche fournie d'os pharyngiens munis de nombreuses dents en pavé. Opercules armés de pointes.