

304 HISTOIRE NATURELLE

très-rapidement en un filet très-étroit, qui constitue la partie antérieure.

Goeze, Eingew. tab. 32. B. fig. 28, 31. *Batsch*. Bandw. fig. 90, 169. Encycl. pl. 48. fig. 16 à 19. Se trouve dans les intestins du milan.

Tænia candelabre, *Tænia candelabraria*.

Les articulations oblongues; le milieu campaniforme; des lignes demi-transparentes et parallèles sur leurs bords; l'extrémité antérieure capillaire.

Goeze, Eingew. tab. 32. B. fig. 24, 27. *Batsch*. Bandw. fig. 70, 72. Encycl. pl. 48. fig. 11 à 14. Se trouve dans les intestins de la chouette.

Tænia crénelé, *Tænia crenata*.

La tête obtuse; le cou très-long; les articulations crénelées; leur largeur excédant six fois leur longueur.

Batsch, Bandw. fig. 114, 115. *Goeze*. tab. 31. B. fig. 14, 15. Encycl. pl. 47. fig. 3, 4. Se trouve dans les intestins du grand pic.

Tænia lancéolé, *Tænia lanceolata*.

Longuement lancéolé; les articulations très-courtes, décroissant petit-à-petit; la tête semblable à un mamelon.

Bloch, Eingew. tab. 11. fig. 5, 6, 9. *Goeze*. Eingew. tab. 29. fig. 3, 12. *Pallas*. Beytr. 1. tab. 3. fig. 26. *Batsch*. Bandw. fig. 28. 167. Encyclopédie, pl. 45. fig. 15 à 24.

Se trouve dans les intestins du canard, du harle, et autres oiseaux aquatiques.

Tænia sétigère, *Tænia setigera*.

Corps portant d'un seul côté des soies minces, courtes, cylindriques et tronquées.

Frœlich. Naturf. 24. tab. 4. fig. 1 — 7. Se trouve dans les intestins du canard.