

PHARMACOLOGIE

BRONCHITES AIGÜES (adultes) :

Sirop de diacode....	50 grammes.
Sirop de belladone....	20 grammes.
Eau de laurier-cerise....	10 grammes.
Hydrolate de tilleul....	40 grammes.

Une cuillerée à soupe toutes les trois heures — ou bien :

Sirop diacode....	} ää 30 grammes.
Eau distillée de laurier-cerise....	
Sirop de Tolu....	
Eau de fleur d'oranger....	

Une cuillerée à soupe toutes les trois heures.

BRONCHITES DIFFUSES :

Dans les bronchites diffuses avec fièvre :

Sulfate de quinine....	0 g. 30 centigr.
Poudre de Dover....	0 g. 15 centigr.

Pour un cachet, deux fois par jour. Favoriser l'expectoration par :

Poudre d'ipécac....	0 g. 30 centigr.
Ergotine Bongean....	2 g.
Julep gommeux cu looch blanc....	125 g.
Fine champagne (cognac) ou vin blanc.	40 g.

Une cuillerée à soupe toutes les deux heures. Quant l'expectoration devient abondante et purulente donner la *terpine* :

Terpine....	10 grammes
Glycerine....	150 grammes
Alcool à 90°....	150 grammes
Sirop de miel....	125 grammes
Teinture de vanille....	10 grammes

2 à 4 cuillerées à soupe par jour. Appliquer les ventouses sèches, donner les bains chauds, soutenir le cœur chez les vieillards, le repos au lit chez les tuberculeux. — (G. Lyon).

DYSPEPSIE FLATULENTE :

(1) Teinture de noix vomique....	5 grammes.
Gouttes amères de Baumé....	} ää 10 grammes.
Teinture de gentiane....	
Teinture de rhubarbe composée....	} ää 20 grammes.
Eau de laurier-cerise....	
Eau de menthe....	

(1) Une cuillerée à thé avant les repas.

(2) Au milieu du repas prendre une cuillerée à soupe de la solution suivante :

(2) Acide chlorhydrique officinal....	3 grammes.
Sulfate de strychnine....	0 g. 05 centigr.
Eau....	300 c.c.