mais, on n'a pas pu connaître si la présence de ces streptococci étaient une cause. Il en est de même des bacilles dont la présence est souvent observée dans cette affection, mais ces bacilles ou streptococci sont-ils la cause du purpura, ou leur présence est-elle accidentelle.

On remarque que les macules pétéchiales du purpura sont toujours formées par une extravasation du sang qui a lieu à travers les diverses couches de la peau, particulièrement dans le chorion et le tissu cellulaire sous cutané.

Des que l'extravasation sanguine a lieu à travers les tissus, on observe la formation des macules, et la couleur caractéristique de celles-ci, est due aux matières colorantes du sang.

L'épanchement sanguin qui a lieu à travers les tissus, cause chez certaines personnes, une sensibilité locale, qui est plus ou moins prononcée.

Cette sensibilité si elle existe est perçue dès qu'il y a contact ou choc, et elle a beaucoup d'analogie avec celle ressentie après une contusion, mais elle n'en a pas l'acuité.

L'extravasation sanguine pour disparaître, doit être absorbée : les éléments fluides le sont les premiers, la matière colorante ne disparaît qu'en dernier et la macule présente durant les diverses phases de la réabsorption, les mêmes phénomènes, que ceux observés après une contusion, accompagnée d'ecchymoses.

Ces macules passent aussi du pourpre au bleu-verdâtre ou jaunâtre avant de disparaître, on observe souvent chez un patient des macules offrant à l'examen les diverses phases de l'absorption depuis l'extravasation sanguine récente jusqu'à la presque disparition de la macule.

TRAITEMENT

Le traitement du purpura simple n'offre aucune difficulté et ne sera considéré que lorsque nous parlerons du traitement du purpura en général.

PURPURA HEMORRHAGICA

Cette variété de l'affection doit être accompagnée de symptômes autrement graves que ceux que nous observons dans le purpura simple.

Cette affection est ordinairement précédée de certains symptômes dont quelques-uns sont observés dans le purpura simple, et qui ne diffèrent que par leur intensité.

Les principaux symptômes du purpura hémorrhagique sont lassitude, mélancolie ; le malade est morose, abattu, triste ; perte complète de l'appétit, constipation opiniâtre, (A ce sujet j'ai observée que chez certaines personnes atteintes de purpura, cette constipation se continuait même après la guérison complète), les malades accusent cer-