

♀—Long. .42 pcc. Noire avec le chaperon, le labre et les mandibules, blanc; les pattes rousses, moins les tarses postérieurs avec l'extrémité de leurs jambes qui sont noirs de même que les hanches. Tête grosse, en carré, très épaisse en arrière des yeux. Ailes hyalines, légèrement obscurcies, les nervures et le stigma, noir, celui-ci jaunâtre à la base. Abdomen déprimé, élargi postérieurement, entièrement noir.—Vancouver (Fletcher).

Voisine de la *rufipes*, Say, mais s'en distinguant par ses hanches et ses écailles alaires noires.

Tenthrede à costa-noir. *Tenthredo nigricostata*, n. sp.

♀—Long. .42 pcc. Noire avec les pattes rousses; l'abdomen d'un noir bleuâtre. Le chaperon et le labre noirs, les mandibules blanches. Ailes avec le costa noir, les hanches aussi noires; pour le reste semblable à la précédente.—Vancouver (Fletcher).

Tenthrede à couleurs-variées—*Tenthredo varipictus*, Nort. Trans. Am. Ent. Soc. II, 234.—Vancouver.

Tenthrede hanches-rousses. *Tenthredo ruficoxa*, n. sp.

♀—Long. .40 pcc. Noire avec l'abdomen roux, le chaperon, le labre, les mandibules, une tache sur les joues remontant en avant en formant une ligne orbitale jusqu'aux antennes, une à la base de celles-ci avec une petite tache au-dessus des hanches postérieures et les bords latéraux du prothorax, blanc-jaunâtre. Les écailles alaires, les pattes, y compris les hanches et les tarses, avec l'abdomen excepté le premier segment, d'un roux foncé. Ailes hyalines avec le stigma roussâtre de même que la nervure sous-costale.—Vancouver (Fletcher).

Tenthrede aux extrémités-noires. *Tenthredo terminalis*, n. sp.

♂—Long. .40 pcc. Noire avec l'abdomen roux. Le chaperon, le labre, les mandibules, une tache au-dessus des hanches postérieures, une autre au-dessus des intermédiaires, blanc. Pattes rousses, les hanches noires à la base, les tarses postérieurs noirs avec l'article terminal roux. Ailes hyalines avec les nervures et le stigma noirs. Abdomen roux, noir à la base et à l'extrémité.—Vancouver (Fletcher).