

APPLICATION DES INSECTICIDES ET DES FONGICIDES.

TABLEAU EXTRAIT D'UN BULLETIN DU COLLÈGE AGRICOLE DU MICHIGAN ET ARRANGÉ POUR LA PROVINCE DE QUÉBEC.

Les cultivateurs et tous ceux qui s'occupent d'arboriculture fruitière commencent à reconnaître la nécessité de protéger leurs récoltes par l'emploi des insecticides et des fongicides. Nous avons tâché de résumer, en peu de mots, la préparation et l'emploi de ces remèdes, sous forme d'un tableau facile à conserver et à consulter.

NOTES EXPLICATIVES.—Quoique le nombre d'applications, tel que recommandé, puisse être utile les années surtout où les maladies fongueuses (dûes aux champignons) font le plus de ravages, il arrive souvent qu'un plus petit nombre d'applications soit suffisant.

L'astérisque (*) indique qu'il faut prendre des précautions en projetant des poisons sur les plantes ou les arbres vers l'époque de la floraison.

La croix (†) indique qu'il y a du danger à employer des poisons sur les fruits, et qu'il faut laisser au moins trois semaines à un mois entre l'application du poison et la récolte des fruits.

ARBRES OU PLANTES.	1ERE APPLICATION.	2EME APPLICATION.	3EME APPLICATION.	4EME APPLICATION.	5EME APPLICATION.	6EME APPLICATION.
CERISERS. (<i>Pruon, charançon, chenille, rouille pourriture.</i>)	Dès l'apparition des boutons de fleurs, mais avant leur épanouissement, Bouillie bordelaise pour les pucerons. Éclaircissement de pétrole.	Lorsque les fruits sont noués, employez la Bouillie bordelaise et le Vert de Paris.*	10 à 14 jours après, si les signes de rouille apparaissent, répétez l'application.	10 à 14 jours après, employez le carboucé de cuivre ammoniacal. †		
FRAISIERS. (<i>Rouille</i>)	Avant la reprise de la végétation, Bouillie bordelaise.	Juste avant l'ouverture des fleurs. Bouillie bordelaise et Vert de Paris.*	Après que le fruit est noué, carbonate de cuivre ammoniacal †	Aussitôt la récolte des fruits terminée, Bouillie bordelaise (si l'on doit garder les fraisières.)	Remarque.—Les jeunes plantations doivent être traitées lors de la sème et 4ème applications faites aux plantes portant fruits.)	
FRAMBOISERS. ET MURIERS. (<i>Anthraxnose, Rouille</i>)	Coupez les tiges fortement atteintes par l'anthraxnose. Avant l'ouverture des bourgeons, arrosez avec de l'eau de sulfure de cuivre.	Lorsque les nonvettes tiges apparaissent, Bouillie bordelaise et Vert de Paris.	10 à 14 jours plus tard, nouvelle application. †	Après la récolte des fruits, enlevez les vieilles tiges; éclaircissez les nouvelles et arrosez avec la Bouillie bordelaise, si c'est nécessaire.	Remarque.—Si la rouille des tiges apparaît, tout le pied malade doit être enlevé avec les racines et brûlé.)	
GADELLIERS.	Des l'apparition des	Si elles réapparaissent,	Si les chenilles n'ont	Après l'enlèvement		