

Traitement.—Le traitement de la paralysie diphtérique est très simple. Il consiste à injecter du sérum antidiphtérique tous les uns ou 2 jours à la dose de 5 à 20 centimètres cubes, suivant l'âge et la gravité de l'affection, à donner à l'enfant du sulfate de strychnine à la dose de 1 à 2 milligrammes par la bouche (dose quotidienne) ou en injection hypodermique (1 c.c. de la solution à 1 ou 2 pour 1000, mille). La teinture de noix vomique à la dose de 6 à 12 gouttes par jour peut remplacer la strychnine, mais n'a pas la valeur de ce dernier médicament. Outre le sérum et la strychnine qui sont les médicaments de choix dans la paralysie diphtérique, il y a un certain nombre d'accidents à conjurer. Ainsi, dans la paralysie du voile du palais et des régions adjacentes, lorsque les liquides refluent par le nez, il faut avoir recours dans l'alimentation à des aliments demi-solides, tels que bouillies épaisses, pâtes alimentaires, purées de légumes, gelées nutritives, etc. L'enfant un peu âgé rejette la tête en arrière afin de pouvoir avaler sans trop de peine la cuillerée de potage, tandis que l'enfant plus jeune a besoin d'être tenu couché sur le ventre, ou sur le dos la tête plus basse que le tronc; quelquefois l'usage de la sonde oesophagienne est nécessaire pour empêcher l'enfant de mourir d'inanition. Si le gavage est mal toléré, on soutiendra le malade avec du sérum artificiel et des lavements nutritifs (lait peptonisé et jaune d'oeuf).

Pour combattre les troubles de l'accommodation on conseille l'usage de l'*ésérine*.

Contre la paralysie des membres de la nuque et du tronc, on a recours (outre le sérum et la strychnine) à des massages, des frictions sèches ou alcooliques, à l'électricité, à des bains sulfureux ou salés, à l'usage du fer, de l'arsenic et d'une alimentation reconstituante (jus de viande, purées de légumes, oeufs).

Dans le cas de paralysie du pneumogastrique et du diaphragme la strychnine et l'électricité seront particulièrement indiquées.

Dans la paralysie du larynx il sera quelquefois, peut-être nécessaire d'avoir recours au tubage en plus du traitement ordinaire. (Marfan, Apert, Comby, Nobécourt, Deguy et Weill, etc.).

Dr. R. FORTIER.

Furoncles, Anthrax,
Suppurations, Diabète,
Grippe, Leucorrhée,
Constipation,
etc.,

LEVURINE

de COUTURIEUX, 18, av. Hoche,
Paris est le seul vrai produit de
ce nom dérivé de la LEVURE de
BIÈRE. En Cachets, en Poudre et
Comprimés.