

PROPORTION DES DÉCÈS CAUSÉS PAR LA DIARRHÉE CHEZ
LES ENFANTS DE MOINS DE DEUX ANS. (PRINCIPALES
VILLES DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA)

Villes	1914	1915	1916
New-York.....	22.2	22.9	18.6
Baltimore.....	24.8	25.1	27.0
Chicago.....	37.7	36.2	40.9
Détroit.....		24.0	22.0
Buffalo.....		27.7	28.5
Cleveland.....	37.2	35.9	
Philadelphie.....		27.6	26.5
Winnipeg.....	33.3	25.0	
Vancouver.....	16.6	12.7	10.7
Ottawa.....		26.9	25.5
Montréal.....	45.3	40.9	44.4

C'est donc bien le lait qu'il faut surveiller; et, par conséquent, le régime alimentaire de l'enfant. Si nous avons paru exprimer un doute à ce sujet, c'est qu'il ne nous semble pas qu'il faille attribuer au lait l'ensemble de nos malheurs. C'est si vite dit ! Personne ne s'élèvera contre une réglementation plus sévère de la distribution du lait dans nos centres importants; mais, la distribution faite, le lait reste dans les maisons où il arrive qu'il soit rendu plus nuisible encore par suite du plus impardonnable manque de précaution. Voilà ce qui est plus grave. « A part la difficulté de se procurer du lait pur et frais, écrit le docteur Joseph Gauvreau, il y a, pour les pauvres surtout, la non moins grande difficulté de le conserver tel à domicile pendant les chaleurs, et cette autre, pour les riches comme pour les pauvres, de savoir le doser convenablement pour les enfants de différents âges. »¹ On voit que le problème est plus compliqué que l'on ne croit généralement. Aurait-on d'ailleurs obtenu que la traite du lait fut faite avec plus de soins, que la distribution et la conservation du lait fussent assurées avec plus de surveil-

¹ *La Goutte de Lait*. Cf. les études des docteurs Séverin Lachapelle, Joseph Leduc et Raoul Masson. (*Compte-rendu de la première Conférence des Gouttes de lait*, 1913).