

important dans la pathogénie de la colique saturnine et qu'il faut tenir compte du spasme des vaisseaux abdominaux, on prescrira les médicaments vaso-dilatateurs, inhalations de nitrite d'amyle ou, à l'intérieur, trinitrine :

Solution alcoolisée de trinitrine au centième... . XL gouttes.
Eau distillée 300 gr.

prendre deux cuillerées à soupe par 24 heures.

5° La sédation de la douleur, presque toujours obtenue par les moyens précédents, n'entraîne pas toujours l'évacuation de l'intestin.

On s'efforcera alors d'obtenir celle-ci le deuxième ou le troisième jour, non pas par l'emploi des drastiques, mais par les purgatifs doux, huile de ricin (15 à 25 grammes ou) :

Sulfate de soude } aa 15 gr.
Sulfate de magnésie }

à prendre, en une fois, le matin à jeun dans un verre d'eau.

L'administration de ce purgatif salin aura encore pour avantage d'aider à la transformation en sulfure du plomb passé dans l'intestin.

Si la constipation résiste à ces purgatifs, recourir aux irrigations intestinales faites avec de l'eau très chaude (45 à 48°) dont on injecte 250 à 500 grammes.

En cas d'échec, on pourra employer le lavement électrique. La sonde rectale introduite profondément est reliée au pôle négatif d'un appareil à courant continu ; l'autre électrode, large plaque, est appliquée sur l'abdomen ; on introduit un lavement d'un demi-litre d'eau salée dans le rectum et l'on fait passer un courant progressivement croissant jusqu'à 30 et 40 milliampères, traversé de renversements brusques toutes les deux minutes environ ; durée de la séance : 20 à 30 minutes. Souvent une selle abondante se produit aussitôt après.

Se rappeler toutefois que lavements simples et plus encore lavements électriques sont absolument contre-indiqués si le diagnostic d'appendicite n'a pu être écarté avec une certitude absolue.

6° Pendant toute la durée de la crise, le malade sera maintenu à la diète liquide : eau pure, puis bouillon de légumes et petites quantités de lait. On pourra le soutenir en pratiquant chaque jour une injection de sérum de 500 grammes. Pour quelques auteurs (Lemaire, Deléarde), l'injection de sérum aurait une action curative et provoquerait mieux que les purgatifs et les lavements l'évacuation de l'intestin et la cessation de la crise.