Toxicité des urines des épileptiques.—M. FÉRÉ a étudié par la méthode des injections intraveineuses la toxicité des urines, 10 avant l'attaque d'épilepsie, 20 immédiatement après l'attaque, 30 quelques heures après. Les premières sont de beaucoup les plus convulsivantes et les plus toxiques; pour obtenir des convulsions il suffit de 20 cent. cubes, et la mort survient avec une injection de 25 cent. cubes d'urines *preparoxystiques*.

L'urine de la première miction après l'accès ne donne de convulsions que si on injecte 55 cent. cubes, et 70 ne suffiront pas pour tuer. Enfin il faut 125 cent. cubes et 145 de l'urine de la seconde miction pour obtenir des convulsions et la mort.

Il paraît donc certain qu'avant le paroxysme, les urines des épileptiques contiennent en abondance des substances convulsives et toxiques qui tendent à disparaître ou à diminuer après la décharge.—*Praticien*.

La pilocarpine contre l'ictère.—WITKOWSKI considère la pilocarpine presque comme spécifique contre l'ictère; il affirme même que dans le cas où l'amélioration ne survient qu'après 10-15 jours de traitement, il est à craindre que l'ictère ne soit causé par une tumeur maligne (surtout du foie). C'est ainsi qu'un malade qui souffrait de l'ictère depuis 4 ans fut guéri complètement après un traitement de 3 semaines (0 gr. 01 de pilocarpine en injections sous-cutanées, une ou deux fois par jour). Les mêmes bons résultats furent obtenus dans 30 autres cas analogues traités de la sorte. Les seuls cas où l'auteur a échoué, c'étaient des tumeurs malignes du foie (ictère symptomatique). Voilà pourquoi l'auteur recommande de recourir à la pilocarpine toutes les fois qu'il n'y a pas contre-indication du côté du cœur.—*Journal de médecine*.

Traitement de la syphilis par les préparations iodées, par Em. POOR.—Le diagnostic posé, on fait prendre au malade un purgatif salin et ensuite des bains tièdes.

Le traitement proprement dit consiste dans l'administration d'une eau minérale iodée, dont voici la formule :

Eau distillée.....	300 à 1 000 gr.
Bicarbonate de soude	} ââ 3 à 10 gr.
Sulfate de soude.....	
Iodure de potassium.....	

Mélez. A prendre trois fois par jour une à deux cuillerées à bouche de cette solution étendue de deux fois autant d'eau commune. Toutes les semaines on augmente d'une cuillerée à bouche. A six cuillerées, les manifestations syphilitiques sont toujours en voie de disparition. On augmente jusqu'à neuf à dix cuillerées en vingt-quatre heures. Chaque semaine on fait prendre aux malades un ou deux bains de savon tièdes, et aux anémiques et scrofuleux on donne l'iodure de fer avant la solution d'iode.—*Union médicale*.