

que temps l'administration du remède si l'on craint de voir survenir les accidents de l'hydrargyrisme.

L'on doit instituer le traitement dès le début de la maladie et le faire durer pendant très longtemps avec des intervalles de repos. Le traitement sera d'au moins deux années et quelquefois plus, associant l'iodure de potassium au mercure après la seconde année.

Remarquons ici que le traitement constitutionnel n'est pas le seul traitement convenable à la syphilis; les accidents locaux doivent aussi être traités localement et l'on constatera en agissant ainsi les effets réellement surprenants du mercure en application locale.

C'est ainsi que pendant mon service d'hôpital, l'hiver dernier, j'eus à traiter une patiente atteinte de syphilides tuberculeuses de la face. Cette affection est une manifestation de la 3e période de la syphilis. Chacun sait avec quelle ténacité cette éruption, une fois établie, refuse de céder au traitement. Elle demeure stationnaire de longs mois, pour disparaître enfin très lentement par absorption, laissant derrière elle des taches pigmentées et déprimées. Quelquefois ces syphilides forment des ulcères superficiels ou profonds qui entraînent une grande destruction de tissu. Cette déperdition de tissu se répare tant bien que mal par une longue granulation laissant à la figure d'odieuses balafres qui sont comme les stigmates que cette maladie imprime à ceux qui se sont laissés envahir par elle.

Chez ma patiente, les syphilides s'étaient établies à la face et avaient fait légion, l'affligeant d'un masque repoussant à voir. Depuis huit mois, elle était sous traitement constitutionnel, sans aucun effet apparent sur l'éruption. Je me contentai simplement d'ajouter au traitement général des lotions au bichlorure de mercure pendant le jour, et un léger onguent de calomel, en application durant la nuit. Le résultat fut qu'au bout de trois semaines, cette malade sortait guérie de l'hôpital, et tout ce que nous pouvions voir de ces horribles boutons qui avaient envahi son visage et l'avaient rendu mé-