

Tſjakela. *Rheed. mal.* 3. p. 37. t. 64.

Farbegebende Feige. W.

Habitat in India orientali. Fr.

Simillima praecedenti differt tantum foliis brevioribus duplo latioribus. W.

*23. *FICUS pedunculata.*

F. foliis ovato-oblongis integerrimis acuminatis obtusis, basi obsolete cordatis, receptaculis globosis subgeminatis calyculatis pedunculatis. W.

F. foliis ovato-oblongis cordatis integerrimis acutis glabris, fructibus globosis, pedunculis geminis elongatis. *Ait. Kew.* 3. p. 450.

F. arbor americana arbuti foliis non serrata, fructu pisi magnitudine, funiculis e ramis ad terram demissis prolifera. *Pluk. alm.* 144. t. 178. f. 4.

Stielfrüchtige Feige. W.

Habitat in America meridionali. Fr. (v. f.)

*24. *FICUS cordata.*

F. foliis ovato-lanceolatis integerrimis basi levissime cordatis, receptaculis globosis sessilibus. W.

F. foliis subcordatis ovatis acutis glabris coriaceis, caule fruticoso erecto. *Thunb. diff. de Ficu.* n. 6. c. icone. * *EjUSD. prod.* 12.

Herzblättrige Feige. W.

Habitat ad Cap. b. spei. Fr. (v. v. f. fl.)

Folia sesqui- seu bipollicaria et longiora ovato-lanceolata acuta, basi levissime cordata vel tantum rotundata, integerrima glabra coriacea. W.

*25. *FICUS crassinervia.*

F. foliis ovato-oblongis integerrimis acutis basi obtusis glabris. W.

Ficus crassinervia. *Desf. catal. hort. parif.* 209.

Dickadrigte Feige. W.

Habitat in America meridionali. Fr. (v. f. f. fl.)

Folia tripollicaria ovato-oblonga acuta integerrima basi obtusa vel obsolete et brevissime cordata utrinque glabra venosa, costa media crassitie fere petioli. W.

*26. *FICUS australis.* W.

F. foliis ellipticis integerrimis utrinque rotundato-obtu-

fs
bu

Ficu

Südl

Habi

For

tund

glabr

lis ru

mina

*27. F

F. fol

lib

cau

F. fol

ber

F. (

sub

cau

Klette

Habi

Ra

vel p

que t

*28. F

F. fol

cau

Punct

Habi

Ca

gofus

flexu

ga ob

reflex

ta, p

Petioli

F. Ca

*29. F

F. foli