

La mèche doit recouvrir la fissure, que l'on écarte pour cela.

Si la mèche tombe dans la journée, on en remet une autre le soir, et on l'enlève le lendemain pour la fumigation.

Après huit jours de ce traitement les selles se faisaient sans douleurs, mais dès le quatrième jour on avait supprimé la maguésie. Au dixième jour je supprimai la mèche et au vingt et unième je fis cesser les bains de vapeur, mais en recommandant bien d'en prendre de temps à autre pendant quelques mois. Ce conseil fut loin d'être suivi aussi longtemps. Cependant il n'y eut un commencement de rechute que huit ans après, rechute du reste guérie en quelques jours.—*Bulletin Général de thérapeutique médicale et chirurgicale.*

De l'emploi des bandes de caoutchouc en chirurgie.—Un chirurgien de Boston, du nom de H. A. Martin, a inventé des bandes dont on vante les avantages en Allemagne et en Angleterre. Elles se composent de simples lames de caoutchouc sans interposition d'étoffe et se distinguent de tous les produits similaires du commerce par leur extrême élasticité et leur longue durée.

Leur emploi est surtout indiqué dans les cas d'ulcères de la jambe. On fait un premier tour sur le cou-de-pied, puis on enveloppe peu à peu le membre sans faire de renversés, jusqu'au genou où l'on fixe au moyen d'un lacet. On n'interpose rien entre l'ulcère et la bande qui doit être enlevée, lavée et séchée tous les soirs. Dès les premiers jours, on constate, en même temps qu'une abondante sécrétion de la plaie, un ramollissement des bords lardacés de l'ulcère. Plus tard se montrent des granulations de bonne nature et la cicatrisation s'établit. On peut compter en moyenne que la guérison survient en un nombre de semaine double de celui des centimètres de diamètre de la plaie. Après avoir rapporté sommairement dix sept cas de guérison, Bruns conclut que le plus grand nombre des ulcères de la jambe sont susceptibles de guérir par ce moyen. "La valeur éminemment pratique de procédé, dit-il, consiste dans son extrême simplicité: de plus, le malade n'est pas retenu un instant dans son lit et peut vaquer à ses affaires, considération importante pour la classe ouvrière, plus particulièrement sujette à cette maladie." Le même procédé peut être employé utilement dans les cas de varices volumineuses, ou d'eczéma chronique des extrémités inférieures, ou même d'éléphantiasis de la jambe et d'arthrites de diverses articulations. (*Berlin. klin. Woch.*)—*Le Nouveau Journal Medical.*