une de ces opérations comme sait si bien les pratiquer notre professeur de chirurgie le Dr. Munro. Le sujet opéré était un enfant de cinq ans; après avoir mis le petit sous l'influence du chloroforme, administré par le Dr. Coderre, les médecins présents procédèrent à l'examen, et diagnostiquèrent le calcul de la vessie, après quoi le chirurgien commença l'opération ayant pour but de débarrasser la vessie du corps étranger qui jetait un trouble si cruel dans l'économie de l'enfant. Le chirurgien introduit l'index de la main gauche dans le rectum, où il est maintenu tout le temps de l'opération, fait une incision sur la ligne médiane, divise les tissus jusqu'à la prostrate qu'il dilate graduellement avec l'index de la main droite, fait pénétrer celui-ci dans la vessie, d'où il le retire avec un calcul de la grosseur d'une noix de galle. L'opération pratiquée en cette circonstance est l'opération d'Alarton, ou opération de Marianus modifiée. C'est l'opération médiane moderne, elle a quelque ressemblance avec l'opération bi-latérale de Dupuytrin; c'est une opération par dilatation, elle a cet avantage qu'elle peut être pratiquée sans hémorrhagie, le chirurgien n'a aucune suture à faire.

A Demers, Etud. en Méd.

BIBLIOGRAPHIE.

Lectures sur les principes et la pratique de la médécine faites au Collège Royal de Londres, par Sir Thomas Watsen, Bart. M. D. F. R. S., medecin ordinaire de la Reine; Hon. L. L. D. Cambridge; Hon. D. C. L. Oxford, membre et ex-prédent du Collège Royal du Roi des Médecins de Londres; membre honoraire du Collège du Roi des Médecins d'Irlande; autrefois à l'hópital de Middlesex, membre honoraire du Collège St. Jean, Cambridge; cinquième édition anglaise revisée; publiées avec des illustrations nombreuses,—par Henri Cartshorne A. M. D., professeur d'hygiène à l'université de Pennsylvany, &c.

L'idée de publier sur le continent les ouvrages les plus